


DE LATINIS ET GRÆCIS  
*nominibus arborum, fruticum, herbarum, piscium,  
 & avium Liber: ex Aristotele, Theophrasto, Dio-  
 scoride, Galeno, Aetio, Paulo Aegineta, Actu-  
 ario, Nicandro, Athenæo, Oppiano, Aeliano, Plinio, Her-  
 molao Barbaro, & Iohanne Ruellio: cum Gallica  
 eorum nominum appellatione.*

TERTIA AEDITIO.



LVTETIAE,

*Ex officina Rob. Stephani typographi Regij.*

M. D. XLVII.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

ROBERTVS STEPHANVS  
typographus Regius Lectoribus S.

Ego uerò quod uobis nauare possum, quàm medio-  
cre, & tenue sit intelligo, sed quod efficere possum,  
non committam, in eo, ut diligentiam meam requira-  
tis. Conquerebantur multi, nomina ignorari, quibus  
arbores, frutices, herbæ, pisces, aues appellarentur,  
hancque unam causam esse afferebant, cur earum  
rerum natura nobis incognita esset, sine quarum co-  
gnitione, iucunda uita esse non potest. Curamus ita-  
que totam eam rem ex Græcis & Latinis authoribus  
uobis describi: etymónque, quod uoces ipsæ habeant,  
ex Grammaticorum commentarijs adscribendum pu-  
tauimus. Valete, & his frui uini.

DE ARBORVM, FRUTICVM,  
herbariūque nominibus, tam Latinis, quàm Græ-  
cis, ex uarijs et receptis authoribus, cum Gallica  
eorum appellatione.

Abies, ἄμ, Sapin. Hæc arbor multis uerbis descri-  
bitur à Plinio lib. 16. cap. 10. Abies autem à procerita-  
te, quod in cælum abeat, dicta esse uidetur.

Abrotonum: uel, ut loquitur Theophrastus, Abrota-  
num mas, sarmentosum, gracilibus ramis, ut Absin-  
thium. Auronne.

Abrotonum fœminat, in arbusculā fruticans, et can-  
dicans. petit Cyprez. Scholiastes Nicandri in The-  
riacis Abrotonum dictum scribit, διὰ τὸ ἀβρὸν καὶ ἀ-  
παλὸν φαίνεσθαι πρὸς ὄψιν. id est, quod sit delicatum  
aspectu et tenerum.

Absinthium quum simpliciter profertur, à ueteribus  
Ponticum omnium præstantissimum intelligitur, quod  
Mesues Romanum appellat.

Absinthium marinum, siue Seriphium, Barbotine,  
Mort aux vers.

Absinthium Santonicum in Aquitania Santenique  
appellatur.

Absinthium uulgare, quod Galli Aluynam ab Aloës  
amarore uocant, non uidetur ab antiquis inter absin-  
thia comprehensum, nisi id esse uelimus, quod Diosco-  
rides βαρύπικρον uocatum fuisse scribit. Absinthii au-  
tem Græmatici à comicis ἀπύρηνον dictum, id est, quod  
nemo bibere posset, scribunt: uel ἀπὸ τῆ ἀπείδει, per  
antiphrasin, quod nemo id attingit.

Acacia, quandoquidem uera (quæ ex spina AEGY-



ptia fiebat) deest, nunc apud nos succus pruni sylvestris dici potest. Le ius des peris pruneaulx cuiets, qui croissent es hayes & buissons, mesmement quand ils ne sont du tout meurs.

*Aconitum lycoctonum*, id est *Oridens lupos*, *Luparia*. L'herbe au loup. Aliud est *Pardaliâches*, quod eo pardi necentur. *Officinæ quædam* tuam vulpicam uocant. *Theophrastus lib 9. de historia plantarum*, & eum sequutus *Nicandri interpres*, *Aconitu* nomen habere ab *Aconis Periaudinorum pago*, qui ad *Heracleâ Ponti* est, ubi *Hercules* ab inferis *Cerberum* abduxit, ex cuius spuma *Aconiti* natum est, scribunt. *Ouidius* ἀπὸ τοῦ ἀκόντιος, id est, à cautibus deductam esse sensit, 7. *Metamor.* Quæ quia nascuntur dura uinacia caute, *Agrestes aconita* uocant. *Grammatici* ἀκόντιον dici putant, ὅτι ἀκᾶτα πάλαισιν καὶ ἀήτι ηὐν ὄντι. ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ ἀθλητοῦ, ὧν οἱ νικηταὶ ἀήτιητοι ὄντες οὐ κονιορπιῶνται. Id est, *Aconitum* dictum est, quod uinci non possit: translato sermone ab athletis, qui cum inuicti fuerint, puluere non insperguntur. Visæ est hæc herba, è montibus *Burgundiæ* aduecta: cui rectè omnia à *Dioscoride* de *Aconito* scripta conueniunt: nisi quod nondum experimento probatum est, ea *lupos* aut *canes* interim.

*Acorus* uel *Acorium*, *Flambe* hastarde, ou *Glayeul* de riuere & de marez, & le *Gal. ga* maior des apotiquaires. Quæquâ periculosum est pro *Acoro* capere *Iridē* illam palustrē, la *Flâbe* de riuere: propterea quod eorum herbarū qualitates contrariæ sunt. *Acorus* enim calidus est: *Iris* uerò illa aquatica frigida est.

*Acte*, Latine *Sambucus*, *Suzeau*, Seu.



Acylon, fructus arboris phellodryos, id est ilicis, quæ proprie Suber dicitur. Le fruit de l'arbre qui porte le liege.

Acynos, herba usqueadeo similis Ocymo, ut à multis putetur esse Ocymastrum. Herbe tant semblable au Basilic, qu'à aucuns disent que c'est Basilic sauvage. In quibusdam locis Galliæ appellatur Minutum Ocymum, Basilic menu.

Adiantum albū, est herba, quam Γαζα apud Theophrastū uertit Capillū Veneris, nomine uulgo recepto.

Adiantum nigrū, uulgò Polythrichon dicitur. aliæ species suo ordine exponentur. Adiantum autem interpretes Nicandri scribit dictū esse ὡς γὰρ τὸ μὴ διαίρεσθαι, καὶ βρέχεσθαι ὑπὸ ὑετὸς καὶ ὁρόσου. πῶς φύλλοις γὰρ αὐτοῦ παρὶς ἐκ ἐπιστάει. Id est, quod non humectetur, aut irrigetur à pluuia et rore: folijs enim eius aspergo non infidet.

Andrachne, Latine Portulaca, Pourpier. Serenus uocat Pulli pedē, quasi dicas Poulleped: quod ea herba, præsertim quæ in uineis nascitur, pulli pedem figura referat. Hæc herba αἰμωδία, id est, dentium stuporē, à rebus acidis, acerbis, et austeris sanat.

Ægilops, Avena sterilis, et frugum, ut Theophrastus de causis plantarū scribit, pestis. Festucago à Columella dicitur, quam rura quædam Gallica Folle auoine uocant: laquelle en aucuns pais est appelee Hauron. Sic autem dicta creditur, quod oculorum fistulis (quas αἰχλώπαι Græci uocant) medeatur.

Ægirus, Pópulus nigra, Peuplier noir, que aucuns nomment du Lauron. Ad hanc arborē refertur ea populi species quæ Trembla dicitur. αἰχίρου ἄνθη, id est, flores, seu σπείρα, id est, pilulæ primo partu folio-  
a. iij.

*rum enascentes: Oculi populi in Officinis Pharmacopolarum dicuntur.*

*AEra, Latine Lolium, pestis est etiam tritici & hordei, quæ ab alijs Yurayæ, ab alijs Nielle dicitur.*

*Agallochum, Est ce que les Apotiquaires avecques Aetius & Actuarius, appellant lignum Aloes, duquel on fait des parfums merueilleusement odorans. Aucuns des Cheualiers de Rhodes ont des patenostres de ce bois, & les dames en Italie communement en ont, comme chose bien riche. Quod uero nunc ostenditur in Officinis, est uerius Aspalathum acre & austerum.*

*Agaricum, est fungus innascens arboribus glandiferis, Ilicibus, Abietibus, & Laricibus, uulgo Agaric. Quod olim mittebat Agaria Sarmatiae regio, nunc suppeditant Alpes.*

*Agassillis, L'arbrinceau qui porte la gomme, que les Apotiquaires appellant Ammoniacum.*

*Agrostis, Latine Gramen, uulgo Dens canis dicitur, quod genicula & internodia huius herbae, canis dentes figura & albore referant. Multiplex autem est. Aliud Panicis more paniculas habet: aliud Arundinis proximum est: aliud humi serpit, diciturque à quibusdam Vigoron, quod uigeat, & in agris immortale sit. Αχρόστις uero dicitur ὡς ἂν ἰσάται ὡς ἂν ἀγρόν, quod in agro consistat.*

*Aeiζoon maius, Latine Semperuiuum. Sedum maius, uulgo Ioubarbe, quasi Iouis barba.*

*Aeiζoon minus, uulgo Vermicularis.*

*Aeiζoon hortense, uulgo Trique madame.*

*Alca, Guimauue sauage: Vngarica herba ab Itz-*

lis dicitur. *Alcea* autem ὁρὴ πλὴν ἀγλῶν, id est à robore dicitur, quòd fortiter dysenterijs & ruptis medeatur.

*Alypum* exponitur ab *Actuario* medico *Turbith* album. Nominis autem ratio significat, ὅτι μὴ ἀεὶ οἶσσι λυ'ται, id est, quod mæstitia uacat.

*Alysson* quibusdam putatur *Chanure* sauuage, alijs *Rubia* minor, alijs *Syderitis* tertia, alijs *Cruciat*, cui multum similis est. Sic autem dicitur (ut ait *Galenus*) quòd mirificè morsos à cane rabido curet. λύσσα enim rabiem significat. Multa de hac lege 2. *Antidot.* *Galen.* *Plutarchus* *Sympos.* lib. 3. *Alysson* inter herbas eas numerat, quæ solo contactu, habitu uic, aut aspectu prodesse homini possunt: nunc tamen contra rabidi canis maleficium sumitur.

*Allium*, σκόροδον, *Aulx.* Est & herba, quæ quia olet *Allium*, *Alliariis*, uel *Alliaria* dicitur.

*Allium* *Vlpicum* *Columellæ*, quasi dicas *Punicum*. Dicitur Græcis ἀφροσκόροδον, quòd ei trito multa spuma increseat.

*Alnus*, κλήθρη, *Gallicè* *Aulne*.

*Aloë*, quia uiriditate psittacum refert, uulgo *Perroquet* dicitur.

*Alopecûrus*, Latinè *Cauda uulpina*, herba similis omnino tritico, nisi quòd hirsutior sit, & folium ei latius sit, ut caudam uulpinam referat.

*Alfine*, *Gallicè*, *Mourron*, quod uocabulum factum est à muris aure. Itali uocant *Pauerinam*, quasi dicas gratiam & iucundam pullis anserum. Sic autem dicta est, quòd τὰ ὕλην, id est, loca umbrosa & opaca amet. *Γαζα* uertit auriculam muris.

*Althæa*, *Guimauues*, quasi dicas *Maluaniscum*:  
a.iiij.



propterea quòd eius radicæ paretur uiscum. Theophrastus lib. 9. de historia plātarum μαλάχω ἀρείαν, id est, agrestem maluam esse dicit: Galenus ἀραδενδρομαλάχην, Id est, maluam arboreſcentem appellat. Virgilius & Palladius hāc herbam Ibisum uocant. Dicitur ἀπὸ τῆς ἀγδαίνειν, id est à medendo.

Alumen, Alun: συνήθεια, ἀπὸ τῆς σύρειν, id est, ab astringendo, Græcis dicitur.

Amaranthus, præsertim purpureus, Passeuelours, à priuātina particula α, & uerbo μαράννεσθαι, quasi non marcescens.

Amarantus luteus, uulgò Stoëchas citrina. Ea autem planta frequens est apud Santonas, & in Gallia Narbonensi. Quidam Amarantum eundem cum Heliocryso, alij cum Chrysocome faciunt.

Amaracus, Dioscoridi est nostra Maiorana, quam Græci σάμψρον uocant. Amaracus autem Galeni, est ea species Partenij, quæ folia habet Coriandri, & dicitur Matricaria.

Ambrosia, uulgò Ruta vinacea, & Herba vini dicitur: nam odore unum imitatur, ut quidam, Plinio autem thore, βότρυς appellarint.

Ambubeia, ea est Cichorij syluestris species, quam Græci à multo amarore πικρία dicunt: alij uolunt eam esse speciem, quæ uulgò Denis leonis, & Pisse en list dicitur.

Amni, ea est planta quæ à uulgo Pharmacopolarum Ameos appellatur.

Amygdalus, Amandier.

Amylum, Amydon, sic dictum, quòd sine mola fiat: nam factitium est, & ex medulla tritici præsertim

trimestris paratur.

Anomum, alijs dicitur herba Hierosolymitana, alijs herba quæ fert rosam Hiericantis. Anomi una sæpe Galeno & Actuário ob id dicitur, quod racematim uelut in una cohæreat. Habemus Anomi semen præstantissimum.

ἀμπελος λευκή, id est, Vitis alba: Brionia, Couleuree: alijs Feu ardent dicitur, à vi bacarum eius rubentium urente. Dicitur & Psilothrum, quod ex eius acinis coria depilètur. describitur elegantissimè à Columella in horto suo.

ἀμπελος ῥύαινα, Vitis nigra: Viburnum, Viourne, espece de Couleuree, qui ha les racines & fruit noir: neque alia re differt à vite alba, nisi quod hæc sit radix alba & fructu rubente: illa radix & fructu nigris sit. Qui putant uitem nigram esse nostrum Hobelonum, falluntur: nam Lupus salictarius non fert racemos, sed semina foliata.

Ampeloprason, Porrum uineale, & agreste, simillimum ophioscorodo, folio porri, sed angustiore: uulgo Cepa canina.

Anagallis fœmina, flore cæruleo est: mas uerò puniæ. Vtraque plâta dicitur petit Mourron, & Mourron quarré. Quidam hanc herbam per Corchorium à Nicandro in Theriacis significatam existimant.

Anagyris, frutex assurgens ad parua arboris altitudinem, folia agni casti habens, fructumque ferens in siliqua, ut faba. Quæ uerò plâta uulgo Lignū foetidum dicitur, ab Anagryi longissimè differt. Nomen ex eo inuenit, quod excitata teterrimum odorem emittat.

Androsenum, species Hyperici: Espece d'une herbe

nommee Millepertuis. Vox autem significat ἀσπὸς  
αἷμα, id est, hominis sanguinem: nam hæc planta trita  
hominis sanguinem refert.

Anchusa, Orchanetta uulgò dicitur. huius radice  
mulieres faciem inficiunt cum aqua & ærussa. Thomas  
Magister contendit dicendum esse more Attico ἔρχα,  
unde uerbum ἐρχομαι, id est, fucare. ἐρχομαι au-  
tem deducunt ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ ρίζῃ πυθρὸν ἔχει.

Anemone sativa flore est purpureo, & Coriandri  
folio, uulgò Herba venti. flores à rusticis appellantur  
Coquelourdes.

Anemone sylvestris triplex est, flore purpureo, æru-  
leo, & albo: Rura eius flores Rubis & Passefleurs uo-  
cant. Plinius Anemonē dictā putat, quòd flos nunquā,  
nisi flante uento, se aperiat. Γαζα uertit Fremium.

Anethum, Anet.

Anisum, humilius Anetho, Anis. Nicander in The-  
riacis ἀνισον scribit per η, nisi mendum sit: cuius ra-  
dices uenenatis resistere scribit: appellatur & Fœnicu-  
lum Romanum.

Anonis, uel Ononis, uulgò Resta bouis, & Remora  
aratri, quòd, si in eam incidat arator, boues remore-  
tur. Quidam deducunt ἀπὸ τοῦ ὄνου, & ὄνυμι, quasi di-  
cas Asini oblectationem. Nam ex Græcis quidam affir-  
mant asinos in ea se uolutare, & dorsum suū aculeis  
eius herbæ libenter exterere: in quibusdam Officiis  
dicitur Acutella, & in alijs locis Gallie, Bugraues.

Anthemis, χαμαίμηλον, Id est, Terrenum & humile  
malum, ob id quòd malum redoleat. Camomille.

Aparine, uulgò Rebulus, uel Rubia minor: Rieble  
& Gratteron. dicitur & φιλαίθρωπος, quòd hominum



nestibus tenacissimè hæreat: Itali uocant Grappellā.

Anthirrhinon, alij Oculū cati appellāt, alij Mourron violet. Nomen ex eo habet, quòd (ut Theophrastus ait) καρπὸς ὡς περ μύρου πῖνας ἔχει, Id est, quòd semen uituli naribus simile sit.

Aphaca, uel Aphacæ, est Vicia syluestris, Vesse sauuage. Si Græcum etymon respicias, ã poterit esse priuatiuum, ὅ φακὴ lens, quasi non sit lens. Vel potius ã in ea dictione similitudinem ὅ coniunctionem quandam significat, ut in uocæ ἀγοχός, ὡς ἄμα ἀνδρὶ ὃ ἀνταρ λέγει ἡ ζωὴ. Id est, eodē cum uiro lecto utens. Aphaca ergo ex eo dicitur, quòd sit lenti similis.

Apium, Græcè Selinon. Du persil. Hoc εὐόσμου Theocritus appellat, quòd multam gratiam in iuribus habeat.

Apiū palustre, Græcè ἡλιοσίλινον, quasi dicas Paludapium: uulgò dicitur de la Berle. Alij uolunt esse de L'ache, alij uerò id putant esse quod uulgò Aigrum persil dicitur.

Apium petrosū, Græcè πέτροσίλινον: petendum est ex Macedonia, uel ex Epeiro.

Apium magnum, Græcè ἰπποσίλινον: Γαζα ad uerbum Equapium. Est id quod uulgò dicitur Petroselinum Macedonicū. Columella appellat Oulus atrum, quod Ruellius putat id esse quod Galli uocant de L'ache. Conradus Gesnerus putat Petroselinum id esse quod in Alpibus Ostrutium dicitur, quo nunc Alpini ad omne morborum genus ueluti Panacea utuntur. Hieronymus Tragus uulgarem Pimpinellam nostram ueterum Petroselinum esse contendit.

Apocynon dicitur ob id Cynocrambe, quòd canes

enecat. frequens est in Burgundia prope Matisconem, folio hederaceo, flore candido, fructu fabæ æmulo in siliqua. Ea planta dicitur à quibusdam Hippomanes, quòd si equi ederint, in furorem (ut scribit Hesiodus) agantur. Στόνον est etiam μάλα μμαζμένον φαριάκω, πρὸς ἀρτίρεσσιν κυνῶν. Id est, Est panis ex ueneno aliquo pistus, ad interficiendos canes.

Apollinaris herba, Altercum Plinio, Græcè ὁσνύαμος, ad uerbum, Faba suis, uulgò Hannebanne. Cæterum quod ad nominis Apollinaris rationem attinet, quidam hoc nomine ab Apolline insignitam tradunt, quòd doloribus mitigandis, quasi Dei alicuius beneficio uim habeat. Hyoscyamus autem dicitur (ut Aelianus refert) quòd pastu eius conuellantur sues, præsentis mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris et intus proluerint. Dicitur et à quibusdam ὁσνύαμος, id est, Iouis faba.

Araeus, Vesseron.

Arbutus, Græcè ῥομπός. Arbre portant fruit de la grandeur d'une petite prune, que les tanneurs de cuir en Italie appellent Cerises de dela la mer.

Arction, in Offianis Bardana maior: uulgus Gallicum Glouteron appellat.

Argemone non habet aliud nomen, nisi quòd Hieronymus Tragus putat eam esse plantam, quæ uulgò dicitur Rosa frumenti: nomen autem habet ab ὄρμημα et ὄνμη, quòd oculorū ὄρμημα, id est, albugines et mibeculas abstergat. πύρινον enim et διαπορεύειν (id est, abstersoria et disaïssoria) teste Galeno, est.

Armoracia, ἔσχαρις, id est, Syluestris raphanus: Officinæ Pharmacopolarum uocant Rapistrum.

*Arthritica*, vulgò *Primula veris*, *Ruri* appellatur  
*Cuculi brachula*.

*Aristolochia*, vulgò dicitur de la *Sarrasine*. Dicta  
 est autem *Aristolochia*, quòd sit ἀρίστη τοῦ λοχουούσας,  
 id est, salubris parturientibus. Galenus Plinium imitatus  
 uertit *Mâlum terræ*: sed eo nomine rotundam *Aristolo-*  
*chiam* tantum appellandam omnes consentiunt.

*Armeniaca* mala putantur omnibus nostra *Arbri-*  
*cota*, Nos *Arbricos*. Tamen *Plinius* & *Columella* nu-  
 merant inter *pruna*.

*Arnoglossum*, *Plantago*, *Plantain*. Ad uerbum si-  
 gnificat linguam agninam, cui huius plantæ folia si-  
 milia sunt.

*Arnoglossum minus*, *Plantago minor*, quæ uidetur  
 esse *Lanceolata*.

*Arum* & *Arisarum* plantæ sunt simillimæ, nisi  
 quòd *Arisarum* multò minus est *Aro*. In *Officinis* dicun-  
 tur *Iarum*, *Pes vituli*, *Serpentaria minor*. *Vulgus* uerò  
 plantas has, quòd pistillū promant exerti genitalis effi-  
 gie, nunc *Sacerdotis*, nunc *canis virile* nominat.

*Artemisia*, *Armoise*, *Herbe de saint Iehan*. *Ar-*  
*temisia* autem uocatam existimant ab *Artemisia Mau-*  
*soli* regis uxore, quæ eam adoptando sibi cognominem  
 fecit. Alij à *Diana*, quæ ἀρτεμις dicitur, quòd ea huius  
 herbæ uires prima ostenderit: & quemadmodum *Dea*  
 illa inuocata, parturientibus adesse solebat, sic herba  
 hæc, *Deæ* huius beneficio, malis mulierum medeatur,  
 menses, secundas, fœtusque trahendo, & *matricis con-*  
*clusiones*, & *inflammationes* sanando.

*Artemisia*, ἀρτεμις φειλλος, id est, lata habens folia sim-  
 pliciter dicitur *Armoise*.



*Artemisia*, λεπτόφυλλος, id est, tenuia habens folia, *Matricaria* vulgò, & *Espargoutte*.

*Artemisia*, μονόκλωνος, id est uniramis: vulgò dicitur *Athanasia*: alijs dicitur *Tanacetum*: alijs uidetur esse herba ea, quæ florè *Oculum Indicum* dictum profert.

*Arundo*, *Roseau*.

*Arundo gracilis*, *Columellæ* temporibus *Cannæ* dicebatur.

*Arundo uernacula*, quæ Græcis dicitur *δὶραῖ*, & *Plinio* *Cypria arundo*, fert pappos in summitate non inutiles ad culcitræ faciendas.

*Arundo facta* & crassior *Dioscoridis*, ex qua fiebant sagittæ, non est apud nos: adhuc in Græcia est.

*Arundo σκεδῖας*, id est *Fistularia*, ex qua fiunt calami scriptoriũ.

*Arundo χæσνίας*, id est *Vallaris*, in sepibus & uallis frequens: ab Italicorum vulgò nunc Græcanica dicitur.

*Arundo tibialis*, siue *musica*, ex qua tibicines faciunt ligulas, *Des anches*.

*Arūdines* illæ crebræ in nostris stagnis hoc solo differre uidentur, quòd altera mas, altera fœmina sit.

*Asarum*, seu *Bacchar*, literis transpositis *Galliæ Cabaret* dicitur. *Asarum* sic dictum *Plinio* uidetur, quòd in *σείς*, Id est, coronas textiles nò ueniat. *Hesychius* tamen *ἀσάρων* quasi *ἀσάρων*, Id est, non purgatum, dictum esse putat.

*Ascyron*, simile est *Hyperico*, id est plantæ, quæ *Galliæ* dicitur *Millepertuis*, vulgò autè hæc herba fœnũ durum dicitur: cui Græci uidetur à contrario nomen imposuisse: *σχύρος* enim illis significat asperitatem.

*Aspalathus* inuenitur in *Gallia Narbonensi*, *spina*

ad paruum arborē assurgens, folio rutæ, sed deciduo, ubi Argilier à vulgo dicitur.

Asparagus altilis, à Latinis regius dicitur. Esparge.

Asparagus sylvestris, Asparagus Iulio Polluci dicitur. Corruda Latine. Attici scribunt ἀσπράγος.

Asphodelus, Hastula regia. In Officinis corruptè Afrodilus dicitur. Plāta est folio porraceo, radicibus magnarum glandium effigie, multis simul agnatis, et porcorum cibus est. Quidam Latine Albucum dici putant, sed Albucus est proprie mas, Hastula regia uerò est fœmina.

Asplenium, Ceterach à Pharmacopolis dicitur. Ea autem herba nomen inuenit ab imminuendo splene.

Aster atticus, uel acticus potius, quasi dicas littoralis, inuenitur in litore nostri maris flore intus luteo et circum purpureo, et folijs in stellam decussatis.

Astragalus, Rusticum uel montanum cicer, Cerres sauuaiges. Sic dicta est ea herba, quod radicem crassam et astragalo offi similem habeat.

Atractylis mitior et caulem habens sine folijs, est Cnicus sylvestris. Saffran. bastard, sauuaige. Latini fusum agrestem, aut colum rusticam uocant, quod eius caule rigido ueteres mulieres pro colo uterentur: quod nominis Græci ratio indicat, ἀτρακτῆλις enim dicitur ἀπὸ τῆ τῶν ἀγροίκων γυναικας ἀτρακτῆλις ποιεῖν ἐξ αὐτῆς, Id est, ex eo, quod rusticae mulieres ex ea fusos comparent.

Atractylis caule hirsutior, Carduus benedictus quibusdam esse creditur.

Atriplex, ἀτρίφαις, Arroche, Bonnedame. atriplicem autem quidam ab atrore, quod sanguinem

atrum efficiat, dictum putant. uocatur & Chrysolachanon, id est, aureū olus, quod eius folia flavescent, quando festinat ad semen. Nostra spinachia à quibusdam ad Atriplicem referuntur.

Auellana nux, quasi Abellina: ab Abella oppido unde primum allata est, Auelline, Noisette. λεῖλακα'ρουρ Galeno, & Simeoni Sethi.

Auena, βρόμος, Auoine.

Auricula muris, Myosotis, à quibusdam putatur esse eadem cum Alsine, quæ uulgò dicitur Coquille de prestre, ou Mourron.

## B

Baccharis, herba uulgò dicta Les gans de nostre dame. Virgilius fascinum hac herba depelli scribit. Galenus in Exegesi uocum Hippocratis, dicit interdum accipi pro herba, interdum pro unguento Lydio.

Balustium, secundum Dioscoridem & Galenum, est flos mali granati sylvestris, uulgò Des balustres.

Ballore, Marrubium foetidum, uel Marrubiastrum, Plinius scribit hanc herbā alio nomine à Græcis Melaprason uocari. Officina uocant Marrubiū nigrum.

Balsamum, Baulme: arbuscula est, qua scarificata existit opobalsamum uiribus præstantissimis ad glutinanda uulnera. Quod nunc ostenditur à principibus pro Balsamo, est factitium.

Balsamum, est arbuscula ferens poma mirabilia, Pommes de merueilles. Est autem ea frequens in hortis D. Germani ad urbem.

Batis, alia dicitur Cretha marina, alia est hortensis, quæ Plinio dicitur Asparagus Gallicus: uulgus nostrū nunc Bacilas quasi Baticulas appellare didicit.



*Batrachium*, Latine *Ranunculus*, ab urendi facultate *Flammula* dicitur. *Batrachij* species ea, quæ folijs *apium* refert, vulgò *Apium sylvestre*, & *Apiū risus* nominatur. appellatur & *Sardoa* aut *Sardinia herba*. *Strabo* scribit *Hispanos* toxici genus ex hac herba confecisse, quo hausto, citra dolorem mortem sibi consciscabant. Inuenitur hîc *Batrachij* genus folio aliorum *ranuncolorum* modo, & florem luteum *Martio* proferens, radice bulbosa, rotunda, nucis *auellanae* magnitudine, qua pollicis manus & pedis admotâ, multi hoc anno à peste persanati sunt. est enim caustica herba adeo, ut pustulas excitet, uenenumque trahat. Omnia alia genera *Batrachij* sunt hîc frequentissima in uineis, syluis, & paludibus.

*Bechion*, Latine *Tussilago*, vulgò *Vngula caballina*, & *Pas d'asne*, *Farfurum* etiam dicitur propter similitudinē cum *populo alba*. *Bechion* autem appellatum est, quod βήχας, id est tusses, & *orthopnoæ* si uinet.

*Bellis*, uel *Bellius maior*, *Grande marguerite*. *Officinae* uocant *Consolidam mediam*.

*Beta*, Græcè τεύλον. *De la poree*.

*Betonica*, κέσπον. *Betoine*.

*Betonica erratica*. *Des armories*.

*Betonica altilis*, *Ocillet*.

*Betula*, *Bouleau*.

*Blitum*, *Poree rouge*. herba est insulsa & inutilis: unde *Meretrix blitea*, apud *Plautum* in *Truculento*. *Galli* uocem suam qua inutiles homines *Blifres* appellant, hinc deduxisse uidentur. *Festus* *Blitum* à Græcâ uocε βλάξ deducit. In quibusdam locis *Galliæ* idolus dicitur *Hurgon*.

*Eotrys frutex*, Pymāt. Sabaudi uocant la Miraine.  
*Botrys herba*, est ea quam uulgo Herbam Hierusalem appellant.

*Brassica*, des Choux.

*Brassica Tritiana Columellæ*, & *Lacuturis Plinij*, à uulgo Gallorum *Caulis capitatus* dicitur.

*Brassica apiana*, quam & Cato *Selinociden*, quòd *apium* referat, appellat Choux crespus.

*Brassica Sabellica*, siue *Marucina Plinij*, Choux rouges.

*Brassica marina*, & *Olus marinum Plinij*, uulgo Soldanella.

*Brassica syluestris*, lege *Cynocrambe*.

*Bryonia*, De la Couleuree, alij Du feu ardent.  
 Vide ἀμπλος λάκη.

*Britannica*, alijs ea herba est, quæ ab Italis dicitur *Piatamana*: alijs ea quæ dicitur *Bistorta*: alij putant esse *Lapathū acutum*. Eius autem herbæ etsi origo ad Britannos refertur, circa Rhenum tamen in Germanici Cæsaris exercitu inuentam Plinius author est. Ad Ostia Rheni Soldanella lapathi folio etiamnum inuenitur.

*Bromus*, Auoine.

*Bucraniū*, *Antirrhinon*, uulgo *Oculus cati*, Mourron violet. Quare autem *Bucranium* dicatur, iam expositum est.

*Buceros*, *Fœnum Græcum*, Senegré: *Columella* simpliciter *Siliquam* appellat. *Buceros* dicitur, quòd eius *siliqua cornu bovis* referat.

*Buglossum lingua bovis*, est nostra *Borrago*, quasi *Corrago*, Baillant courage. Nam *Buglossum sanguinem melancholico contrarium* gignit, unde ἀππό-

*ruer à Græcis dicitur.*

Buglossum, siue Buglossa nostra vulgaris, est Cir-  
sion Dioscoridis.

Buglossum, est etiam nostra Solea, piscis.

Buphthalmus, uidetur esse Cotula non fætida. Cæ-  
terū quod dixerit Dioscorides flore esse luteo, ad me-  
diū floris, quod luteum est, respexisse uidetur. Sic dici-  
tur, authore Galeno, quod bonis oculum reseat.

Bulapathum, siue Hippolapathum, De la pabelle.

Bulborum nomine ferè intelligimus quas Eschal-  
lotes & Oignonnette, & Appetiz dicimus. Nicander  
in Theriacis scribit semen bulborum aduersari uene-  
no. Veneri porrò mirè auxiliantur, ut Martialis in li-  
bro Xeniorum,

Cum sit anus coniux, cum sint tibi mortua membra,

Nil aliud bulbis quàm satur esse potes. Columella  
item de iisdem in Hort. ait,

-quæque viros acuiunt, armantque puellas:

Iam Megaris ueniant genitalia semina bulbi. Ob id (ut  
Varro scribit) in legitimis nuptiis olim apponebantur.

Bulbus etiā nomen commune esse potest omnibus,  
quæ radicem coagmentatam instar ceparum habent,  
pelliculis ac inuolucris intectam, ut bulbi Narassi &  
bulbi Cannarū apud Columellam lib. 4. Ab hac autem  
similitudine, Paul. lib. 3. cap. 22. totum oculi corpus una  
cum tunicis ac humoribus bulbum appellat.

Bunias, Bunion, Napus, Nauet.

Buxus, Bouis.

Butomus, Ionc de quoy on fait les cabas.

Bryon, significat Muscum arborū, De la mousse:  
& Muscum en, quo lapides in mari & flumijs (ut Co-  
b. ij.



lumellæ uerbo utar) muscantur, quæ Aetius uocat Hypnum & Sphagnum. Est & Bryon, uillosa quædam congeries in plantis & earum floribus, ut ex Theophrasto lib. 9. De histor. plantarum colligere licet.

## C

Cancamum, in Officiis Cacca dicitur: Actuarius uocat Lacam.

Calaminthæ Dioscoridi tria sunt genera, quorum primum nihil aliud, quam uulgare nostrum Calamentum: secundum Latine Nepeta appellatur. tertium est nostra herba, Catiria, L'herbe au chat. Nicander  $\chi\alpha\mu\acute{\iota}\rho\omicron\nu\omicron\upsilon\sigma\phi\eta\lambda\omega$ , id est, aquaticam Calamintham ueneno resistere in Theriacis scribit.

Caetus à Siculis, Cintra à Græcis dicitur, Artichault. Vide Athenæum lib. 2. Dipnosophist. & Theoph. lib. 6. De hist. plantar.

Calitrychon, est Adiantum album. plura in Polytrichon.

Caltha, Gallicè Soulcie, quasi Solsequie. Nam cum solis ortu aperitur, & cum occasu clauditur. hanc Virgilius luteolo colore tinctam æcinit, & Columella flauentia lumina Calthæ scribit.

Cannabis, Du chanure. Cannabis erratica similis est Eupatorio.

Cacalia, Officiis Liliū conuallium. Gallicè, Grand muguet. Quidam putant esse Cancamum Galeni: Paulus tamen non Cancamum, sed Cancamo simile Cacaliā scribit. alij dicunt semen esse Carui agrestis.

Capnos uel Capnios, Fumeterre. Sic dicitur, quod eius succus oculis infusus, eis noceat, fumi modo.

Capparis, Cappres.

Carus uel Carum, uel, ut recentiores quidā Græci, Carnabum uel Carnabadium, Des carottes: Officinæ Carui uocant.

Cardamum, Cresson alenois. Vide Nasturtium.

Cardamine, Cresson qui viēt es ruisseaulx. quæ herba nihil aliud est, quàm Sisymbrium aquaticum.

Cardamomum, Graine de paradis. Itali uocant Melligretam.

Caryō basilicā, Nux regia, Inglās pſica, Vne noix.

Caryon myrſicon, id est, Nux unguentaria: uulgò Nux moschata.

Caryophillon, Clou de Girofle.

Carduus, simpliciter est Artichault. Et is duplex est, Satiuus, qui Artichault Gallicè dicitur: hunc uerò nonnulli, propterea quòd figura imitetur nucem pineam, σπόειλον appellant. Agrestis est Chardonnette. Carduum autem aduersus uenenata uim habere Nicander author est.

Carpinus est inter genera Aceris, Gallicè, Charme.

Casia syrinx antiquorum, est nostrum Cinnamonum, id est, nostra Canella.

Cassutha, uulgò Podagra lini, Goutte de lin, c'est vne petite herbe qui croist parmi le lin, & le suffoque.

Catanācæ, Pate de loup, alij Bistortā: Catanācæ autē dicitur ὄρε πὸ κατ' ἀράκην, quòd cogat ad amorē.

Caucalis, Persil bastard. In Officinis quibusdam dicitur Pimpinella hirsuta.

Cenchron, & Cenchros, Milium.

Centaurium maius usitur in hortis D. Vassei medici Parisiensis: uocatur perperā in Officinis Rhapon-  
b. iij.

ticum: inuenta autem est hæc planta à Chirone Centauro Herculis sagitta vulnerato.

Centauriū minus Plinio propter multam amaritudinē, Fel terræ dicitur. Olim in Gallia ea plāta Exaci dicebatur, quòd omnes corporis morbos per alium abigeret, quasi ἑξάκρον. vulgus adhuc ex eo uocat Sacotin. Nomen autem habet à Chirone Centauro.

Cepa, κρόμμυον, olim Vnio dicebatur, unde Gallicum nomen, Oignon. Ea capitata si sit, Marfica cepa dicitur. Athenæus lib. 9. Dipnos. scribit κρόμμυον dici κρόμμυον τὰς κόγας μὲν, id est, à claudendis oculis. Nam dum à nobis scinditur, oculos claudimus, lachrymāsque fundimus: unde Lachrymosa cepa Columellæ dicitur. Ceparū autem discrimina ex nationibus lege apud Theophrastum, lib. 8. De hist. plantarum.

Cepa canina, est Ampelopraßon, id est, Porrium uineale.

Cepæa, Portulaca aquatica vulgò dicitur.

Ceratis, à quibusdam Fœnum Græcum, id est, Senegré. Vide Buceros.

Cerasus, Cerisier.

Cerasia, Guisnes doulces.

Cerasia Actiana, Guisnes noires.

Cerasia Aproniana, Guisnes fort rouges.

Cerasia Cæciliana, Guisnes fort rondes.

Cerasia acida, Griotes.

Ceratonia, arbor est cuius fructus Latinis siliquæ uocantur.

Chamaecte, Humilis sambucus; Latinè Ebulus. Hieble.

Chamaecerasus, authore Asclepiade quodam Myr-



leano apud Athenæū, lib. 2. Dipnos. in Bithynia nascitur, cuius fructus edentiū caput tentat nō minus, quā uinū. Quod idem tribuitur mimecylis, id est, fructui arbuti, quem Itali nunc Cerises d'oultre mer appellant.

Chamæcyparissus, Humilis cypressus: uulgò Parua cypressus dicitur, quæ nihil aliud est, quā Abrotonum fœmina: quam plantam Gallicum uulgus appellat petit Cyprez.

Chamæcissos, Hedera terrestris.

Chamædrys, Quercus humilis, & Trixago, Chénette, ou de la German dree.

Chamælea, est Parua olea: in Officinis appellatur Mezereon: tamen multis non placet esse Mezereon Mesux, sed id potius quod dicitur Linum sylvestre, quod in quibusdam locis Galliæ dicitur Gentil bois.

Chamæleon præsertim niger, est folijs similibus Cinnaræ, sed spinosioribus: in Officinis autem quibusdam dicitur Cardopatium, & Carduus suarius, quod si in polenta exhibeatur, interimat.

Chamæleon albus, non habet caulem, sed è medio foliorum complexu statim à radice caput exerit, breui pediculo fultum, & densioribus spinis echinatum, in quo flores emicant purpurascetes, & se in pappos dissoluentes: semē autem non est dissimile Cnico: frequens est in neglectis agris, & in montibus, ob id opiovos à Nicædro dicitur. In quibusdam Officinis dicitur Carlina, à uulgo appellatur Chardouffe.

Chamæpitys, Humilis & terrestris pinus, Aiguë scribonio dicitur, uulgus Iuam Muscatam appellat.

Chelidonium maius, Chelidoine, Esclere.

Chelidoniū minus, uulgò Scrofularia minor dicitur.

tur, quòd strumis, quas Græcum uerbū *χοιειδης* exprimentes scrofulas appellant, medeatur. Quidā è uulgo Des bassins appellāt Chelidonium autē dictum est, uel quòd ea planta in aduentu hirundinis (ut Theophrastus lib. 8. De histor. plantar. ait) floreat, uel quòd pullis suis, hac herba hirundines oculos restituant.

Chondrilla, est illa Sereos species, quæ in segetibus floribus luteis cōspicitur, & est uerum Taraxacon.

Chrysanthemū à quibusdā putatur esse Des marguerites blāches, sed nō rectē: nam flos illi luteus est. uidetur autem ea planta in ripis Gētilliacis. Vel potius Chrysanthemum, est ea Anthemidis species, quæ folijs per ambitum luteis constat, ut Leucanthemum albis.

Chrysolachanon, Atriplex, Bonnes dames.

Cicer, ἐπίκυρος, Chiches. Cicerū autem differentia (ut uertit Plinius ex Theophrasto) plures sunt, magnitudine, figura, colore & sapore. Nigrum cicer quod *ἑρπίς*, id est, arietinū, quòd in eo producta oscilla arietinū rictus imaginem efficiant, uocatur: Galli id genus appellant Chiches. aliud genus dicitur Columbinum, quo per hyemem aues illæ pascuntur: hoc & Venerē Plinius uocari ait, Columella Punicum gentili nomine appellat: id autem est candidū, rotundū, læue, arietino minus. Cicerulam etiā Columella Ciceris nomine censet, quod legumen uulgus Gallicum Iesse appellat.

Cichoriū, est Seris syluestris, quæ Picris dicitur, Cichoree sauuage. Vide Seris. Iulius Pollux scribit nomine Cichoriū omnia syluestria olera comprehensa ab antiquis, quæ gracilia & tenuia cognominabantur.

Cyclaminus alia, radiæ est rotunda, unde nomen habet, folio hederæ infernè suppurpurascēte, & su-

pernè uirescente. Alia emittit radículas sursum superuacuas & inutiles. Latini Cyclaminū Rapum & tuber terræ appellant, uulgò Panis porcinus dicitur.

Cicuta, *κικυδιον*, Cigue. Cicuta famam auxerunt Athenienses: nam suco eius ad mortem in publicis iudicijs utebantur: uenenata est enim potio, ut est apud Nicandrum in Alexipharmacis.

Cydonia malus, Vne coingnaciere. Dicta est autē Cydonia (authore Q. Sereno) quod ē Cydone Crete insulæ urbe aduecta sit.

Cinnamonum, uel ipsis indigenis quid sit ignoratur. Nostra enim Canella est uera Cassia antiquorum.

Cinara, Artichault: à puella quæ in eam plantam mutata est.

Cynobatos, Rubus canis, Esglantier. De hoc dicitur in dictione Rubus.

Cynoglosson, Lingua canis, est planta similis Orchanettæ nostræ, sed est sine caule. non quidem Lingua canis herbariorum uulgarium: nam uerum Cynoglosson folio est molli, uenoso, latiusculo, lanugine molli. canescit, & in sabuletis nascitur.

Cyparissus, Cyprez. Pilulæ cupressi dicuntur Coni, unde Conisera cupressi apud Virgilium. Marcus Varro Galbulos uocat: Græci eas uocant *σπείρα κωνοειδίου*. Grammatici annotant dictam esse *ὄρεγ' τὸ κώνυ πειρίου τὸς ἀρεμύνας*, id est, quod pariles fructus & ramos pariat. Lege Ruellium.

Cyperus: tota planta est Souchet. Sunt qui Galangā syluestre uocant. Cornelius Celsus Iuncum quadratū, Plinius Iuncum triangularē & angulosum appellat.

Cyperis, radix cyperi, præsertim ea quæ oblonga



oliuæ similis est, præcipui in medicina usus.

Cypirus, palustris planta, Gladiolus à Γαζα uertitur, à cultellati folij figura.

Circæa, planta dodrantalis, Solani folijs, fruticosa, semine hirsuto, uulgari nomine caret. nomen autem à Circæ habere uidetur.

Cirsion, Vide Buglossum.

Cisthus, frequētissima est in Gallia Narbonensi, ubi ea nō assurgit supra hominis altitudinē: ex huius plantæ radicæ existit uelut fungus Hypocistis dictus: ex quo contuso fit Hypocistis Pharmacopolarū. Dicitur autē in ea regione planta hæc, et in montibus Senensibus et Lucensibus, lingua canina, De la garine. In altero genere Cisthi est ros quidā pinguis, caprarū, hanc plantā depascentium, barbis inhærens, qui dicitur Ladanum.

Cytinos, uocamus futura mora: quare prima germinatio unde promittimus nobis malū Punicum, est Cytinus: alij uolunt Cytinum florem mali Punicæ satiuæ, Balaustium uerò agrestis: uox autem hæc deduci uidetur à nomine κύτος, quod captum et ambitum significat. nam Cytini in Punicis dicti sunt, quod suo ambitu et captu futurum iam pomum intra se contineant, et quasi conceptos acinorum foetus ad maturitatem complectantur.

Cytisus, caule est longo, crasso, ut brassica: folio trifolij pratensis. Quærendus est in alpibus: flos eius tam magnus est, ut satis sit capræ pascendæ in unum diē. eius autem laudes lege apud Columellam lib. 7.

Clematis daphnoides, Vinca peruinca Plinio, uulgo Du lisseron, De la peruenche.

Clinopodium, folijs est serpilli, floribus in geniculis

imitantibus florē Marrubij, quidam uocāt Pulegium montanum: uox ad uerbum significat Pedem lecti, quē hęc planta figura imitatur.

Clymenum, uulgò Saponalis, & herba Cypria: Plinius scribit inuentum à rege Clymeno.

Cnicus, uel Cneus, Officinis Cartamum uocatur, Saffran sauuage, & bastard.

Cocalis Hippocratis, La pomme de l'artichault. Quidam ex Latinis uocauerunt echinum illum siue capitulum *σπόειλον*, quòd nucē pineam referat. Columella totam plantam uocat Cinarā.

Coccus tinctoria, κόκκος βαφικὴ, species est Ilicis humilis, quæ in Gallia Narbonensi frequentissima est, ubi Vermeillon: ab alijs Escarlatte dicitur: Arabes uocant Kermes, unde Cramoisinus color, quasi Kermesinus.

Colchicum, Mort a chien.

Colymbades oliuæ, quæ puræ, id est, sine accersitis commendatione oleo suo innatant, & ueluti urinabunda fluitant. Dictæ autē sunt ἀπὸ τοῦ κολυβάδην, id est, urinari. Diphilus quidam apud Athenæū dicit ἡ αἶς ὀλιγοῦ φοις εἶναι, καὶ κεφαλαλγίαι· τὰς δὲ κολυβάδας καλουμένας ὡς μαχοπέρας: id est, Oliuas parum alere, & malum capiti inferre: colymbadas autem stomacho magis conuenire.

Colocasie uel Colocasiy nomine, totam plantam fabæ Aegyptiæ Plinius: Diphilus uerò apud Athenæum lib. 2. Dipnosophist. solam radicem intelligit.

Colocynthis, colocynthidos, Cource sauuage, Coloquinte.

Colocyntha hortensis, Cucurbita, Cource.

Colutea, uel Colytea, Baguenaudier.

Conserua, est herba villosæ densitatis atque fistulosa: ea autem inuenitur enatās fluminū uadis, spongiæ referens imaginem. uulgus Spongiam fluuiālē uocat. Nomen ex eo inuenit, quod præsentaneum sit (authore Plinio) remedium aduersus fracta ossa, quæ cum per poron glutinantur, conseruere à Celso uocem Græcam Hippocratis  $\kappa\alpha\tau\omega\iota\epsilon\delta\alpha\iota$  exprimente, dicuntur.

Conyze utriusque folia sunt oliuæ similia, hirsuta, pingua: in maiore, caulis duorum cubitorum altitudine attollitur: in minore, pedem æquat. Theodorus Gaza apud Aristotelem lib. 5. De histor. animalium, uertit Pulicariam. quo loco Aristoteles polypum à saxis, nisi admota cunila, cuius odorem sentiat, non posse auelli tradit. Quem locum Plinius lib. 10. cap. 70, exprimens, Conyzam, Cunilam interpretatur. Dicitur uulgò Herba pulicaris, Herba contra pestē, & Herbe de saint Roch. Nicander in Theriacis & Alexipharmacis, ueneno resistere scribit.

Cōsilio Columellæ & Plinij, ea est plāta, quæ nūc à uulgo Gallorū Pomelea, quasi Pulmonea dicitur, quòd remedium sit præsens aduersus pulmonum uitia: hac enim utuntur ueterinarij medici in affectibus pulmonum. Quidam herbarij Patam leonis uocant.

Conuolulus,  $\kappa\alpha\tau\omega\iota\epsilon\delta\alpha\iota$ , folijs est hederæ longè minoribus, & in mucronem turbinatis, & herbas alias suo reptatu inuoluit: uulgus Campanulam, & du liset appellat: in Officiis Volubilis dicitur: quidam & Liliastrum uocant. Nam (ut Plinius ait) Conuolulus, est rudimentum naturæ lilia facere condiscantis.  $\kappa\alpha\tau\omega\iota\epsilon\delta\alpha\iota$  autem  $\alpha\pi\omicron\tau\epsilon\ \eta\gamma\omicron\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \xi\epsilon\omicron\varsigma$  deducunt, quasi dicas paludum hospitem.



Coriandrum, κοριανδρον, uel κόριον, Coriandre. Nicander reponit inter uenenatas potiones.

Corylus, Couldre.

Coris, est genus Ericæ, Vne sorte de Bruyere.

Cornus, Cornouiller.

Coronopus, ab alijs dicitur Capreola, ab alijs Gramme, quod uulgus Dentē canis uocat: alijs putatur herbula nascēs in syluis, folio nascentis coriādri: alijs uidetur esse Cornu cerui. Quāuis autē etymō sit Pes corui, non est tamē ea planta, quæ pro Pede corui ostenditur.

Corruda, Vide Asparagus.

Costus, apud recentiores Græcos ea herba est, quæ uulgō dicitur Du cocq. Ruellius putat id esse quod Plinius Siliquastrū & Piperitim uocat, De la poyurette. Sunt qui mentham Romanam uocant, alij mentham Sarracenicam. Veteres Græci per Costum, radicem tantum intelligebant, quam etiamnum habemus admodum acrem. Costus autem Arabum dulcis, Græcis indictus est, sed κόστος γλυκὺς Actuārio, Arabas inuitanti, in secundo Dialacham dicitur.

Coryledon, Umbilicus Veneris. Nomen retinet. Sunt Officinæ quæ Cymbalariam uocant: uulgus Italicum Dinarellam uocat. Nomen ex eo habet, quod folio sic rotunditatis circinatæ, in medio cauato, acetabuli more: nam Coryledon, acetabulum significat.

Cotonium malum, κοιδάριον. Duplex est: aliud minus, rotundius, & acerbius, quod masculum uocamus: Galliæ, Coing franc: aliud longius, maius, & minus acerbum, Coingnasse. Galenus autem, ea mala uocat Struthia: & lib. 2. Alimentorū, Struthiomela, a cause qu' ils ressemblent à vng oeuf d' Autruche.

*Crataegonum*, Curage uocatur à Gallis, à multis acrimonia qua writ. Nomen ex eo habet, quòd uiri & foeminae semini dominetur.

*Crategon*, *Aquisfolium*, Houx.

*Crithmon* siue *Crithamon*, Batis Plinio (unde etiam *Baticulam* Ligures uocant) & *Olus cordum Columellae* dicitur. Creste marine. Huius herbae condituram lege apud Columellam lib. 13. cap. 13.

*Crinon*, Latine *Lilium*, Lis.

*Crocus*, Saffran.

*Crocodilium*, nomen retinet. Ruellius omnino arbitratur esse eam herbam quam *Carlinam* appellant.

*Croton* est *Ricinus*, id est, palma Christi. Sic autem dicitur, quòd semen τὸν κρότωνα, id est, uermiculum referat qui canibus haeret, quem uulgus Gallorum *Tiquam* appellat.

*Cucurbita*, Courge.

*Cucurbita cameraria*, quae facili & admodum flexibili ramorum curuitate tecta, operit pergulas.

*Cucurbita angularis*, crescens in multa longitudine.

*Cucurbita somphos* Graecis dicta, coactae breuitatis, digitali crassitudine, & in saxosis nascent, à nobis *Barbara* & *marina* dicitur.

*Cucurbita hortensis*, κοκύνθη dicitur, quam Athenaeus & σικῶν à Nicandro in Georgicis appellari scribit. sed Grammatici hoc esse discrimen inter κοκύνθη & σικῶν esse uolunt, quòd κοκύνθη, cucurbitam rotundam & in globum tumentem significet: σικῶν uerò teretem & in longitudinem extensam.

*Cucumis satiuus*, Concombre.

*Cucumis syluestris*, uulgò *Cucumis Asininus*,

Anguineus: cuius Suctus Elaterium dicitur.

Cucumis, Græcè σίκυον uel σίκως. quanquam σίκυον nomine multa genera Græci ueteres comprehēderunt, nempe quæ aut cartilagine aut cute foris obducta, in oleribus extra terrā crescunt: posteriores tamen σίκυον, id est cucumerem simpliciter dixerunt, quem nos priuatim modo cucumerem uocamus: adiecta autem peponis uoce, hunc quem nostra ætas priuatim peponem nominat, σίκυον πεπονα appellantes.

Cuminum, Commin.

Cunila Græcè Thymbra, est Satureia, Sarriette.

Cynosorchis, Latine testiculus canis, quod nomē uulgus retinet. dicitur & Serapias, à Serapi Aegyptiorum Deo, propter magnam lasciuia, qua is Deus Canopi colebatur.

Cyphi, ferè respondet nostræ auiculæ Cypriæ, c'est quasi vng mesme perfun que l'oïselet de Cypre. Hoc suffitu Aegyptij sua numina sibi placabant. Eius autem compositio est apud Dioscoridem, Galenum, & Plutarchum, De Sacris Isidis & Osiridis.

D

Dacrydion, à reatioribus Græcis dicitur ea lacryma, quæ funditur à radice Scammonæ, uulgò Diagrydion corruptè dicitur.

Dactyli, Dactes, & Figues royales. Symeon Sethi multa ex ueteribus Græcis de Dactylorum natura collegit: tu eum commentarium adito. Nicander in Alexipharmacis tradit palmæ fructum cum lacte sumptum mederi haustæ buprestis.

Damasonium, Plinio Alisma, ab alijs uulgò Plantago aquatica, ab alijs fistula pastoralis dicitur.



*Daphnoides, Laureola.*

*Daucus*, uel *Daucū* neutro genere, Carottes, ou Pannets sauuages: quod intelligendū est de primo genere *Dauci* nobis frequētissimum, quod est folio fœniculi. Nam secundum apī, tertium uerò coriandri folium habet, omnia tamen *Dauci* genera sunt odorata.

*Dipsacus*, uulgo *Labrum Veneris*, *Virga pastoris*, *Chardon de bonnetier*. Dictus est autem *Dipsacus*, ὡς ἀπὸ τοῦ ἀκροῦ τῆς διψῆς, id est, à remedio sitis. Nam in foliorum cavitatibus aquam habet, qua sitim sedat.

*Draba*, aliàs uulgo uocatur *Araba*. Apud quosdam herbarios dicitur *Nasturtium Orientale*, & *Babylonium*: apud alios *Cuminum sylvestre*.

*Dracunculus*, δρακοντίνα, uulgo *Serpentaria*. Arum & δρακόντιον appellari existimat Theophrastus, διὰ τὸ πὺν καυλὸν ἔχειν τὴν τοῦ πικυλίου, id est, propterea quod eius caulis uariis est.

*Drupæ* sunt bacæ olinariū, maturitate nigrescentes, uocæ à Græcis deducta, qui eas δρυπετίς appellant.

*Dryopteris* in ueterum quercuum musco nascitur, uulgo *Osmunda regalis*, uel potius *Filicula*. Nam pro polypodio legitur.

*Dios anthos*, Coquelourdes.

## E

*Ebulus*, *Chamaæcte*, est humilis *Sambucus*. Hieble.

*Echiū*, herba est similis *Anchusæ* & *Buglossō*, adeo ut nonnulli uocent *Buglossum sylvestre*, uulgo dicitur herba *Hircina*. Deducitur à nomine ἔχιν, id est, uipera, aduersus cuius letalē icthū (ut Nicander in *Theriacis* scribit) ualet. quo loco hæc plāta multis uerbis ab eo authore describitur. Plinius tamen sic dictum putat,

quòd eius semina uiperinis capitibus simillima sint.

Elaphoboscum, Latine Pabulum ærui. Quidā Galli uocant de la Falouze. Apud quosdam herbarios dicitur Gratia Dei. Dicitur & hæc planta Ophioctonon, quòd ea ærui se arment aduersus serpentes.

Elatine, folijs helxines, nisi quòd sunt minutiora & scabriora: campestre Rapistrū, Raue sauuage. Quidam putant esse Gramen Parnasium, sed falso.

Elaterium, Vide Cucumis sylvestris.

Eleliphacos, Salvia, quam ἑλεφάκω, id est, medendi uiribus præstantem, uocat Nicander in Theriacis.

Elichryson, uel Heliochryson Dioscoridis, est Galei & Pauli Amarantus luteus, qui in Officinis dicitur Stœchas citri: planta frequēs est in Gallia Narbonēsi. Dicitur autē Heliochryson, q̄ ad solis repercussum, comantibus in orbē florū folijs fulgorem auri præ se ferat.

Elleborus albus à flore & radiæ alba, Niger contra: Latine Veratrum, Verart, & Ellebore, Niger innoxenter sumitur.

Empetrum, uel Epipetrum, ut Aëtius, folio est roris marini, sed crassiore & latiore, nascens in rupibus & saxis ad mare, ut promonteriorum crepidines ferè hac herba uestiatur: Persé pierre vulgò dicitur, q̄ saxa penetrare uideatur. Ea herba in hortos iam translata est, expetiturque in acetarijs, quòd sapore salso sit.

Ephemerum illud non εφαιμέριον, secundum Galenum est Iris sylvestris, quod ab alijs putatur esse Hemerocalles, ab alijs Liliū conuallium, ab alijs Grand muguet dicitur.

Ephemerum aliud Colchicum, quo die sumptū fuerit (ut nominis ipsa ratio ostēdit) interimut. Colchicum

autem à Colchide solo natali dictum est, cuius antidota extant apud Nicandrum in Alexipharmacis.

Epimelis, est uera Mespilus nostra, ut ait Musa. Hippocrates *γυμνασίον* d. i. primo de morbis mulierum, fructum huius arboris *ἀμαμνίδα* uocat, ut Galenus in glossis eiusdem exponit.

Epiroticis malis putantur respondere nostra Orbicularia poma, Pommes de capendu.

Epithymum secundum Dioscoridem & Græcos, est flos è Thymo duriore, & Satureiæ simili. Secundum Arabas est Cuscuta thymo innata, & ueluti capillus quidam ruber circa herbas innascens, ut circa linum nascitur Cuscuta, quæ dicitur Linobanche, quasi linum suffocans. Eadem nascitur circa Orobum, & dicitur Orobanche. Innascitur & Satureiæ seu Thymbræ: & dicitur ab Aëtuario Epithymbrum. Cæterum uox Epithymum significat aliquid in Thymo nascens.

Equisetum, Vide Hippuris.

Erica, *ἐρεϊκὴ*, Bruyere.

Eryngium uel (ut Plinius loquitur) Erynge, est ex genere aculeatorum, Græci quidam *ἐρερινόφαλον* dixerunt, quod nomen uulgus retinuit, Centum capita eam plantam appellans, quod infinita capita in stellas ducta habeat. Nicander in Theriacis Eryngium uenenis resistere affirmat.

Erysimum Latine Irio uel Trio (ut quædam Plinij exemplaria habent) uel Trionum (ut *Γάρφα* uertit apud Theophrastum) herba est quæ à quibusdam herbarijs dicitur Sinapi syluestre. In locis quibusdam Gallie dicitur Tortella. Itali uocant Erucam nobilem. frequens autem est in uallis urbis. Est & fruges, quæ uulgus Blé Sarrafin appellat.



*Eruca*, ἄζωμος, Roquette. ἄζωμος autem dicitur, quod multa eius suauitas sit (ut Plinius ait) in con-  
diendis opsonijs.

*Erithrodanum* vulgò *Rubia tinctorum*. Garan-  
te. Καζα uertit *Rubiam*.

*Eruum*, Græcè *Orobus*, Des ers. Santones legumen  
quoddam appellant *Garrobe*, nomine (ut arbitror) ab  
*Orobo* deducto: sed id non omnino simile est. *Orobo*  
*Dioscoridis*. ὀροβος ἐφθός βοῦς λιπαίνει (authore *Diosco-*  
*ride*) id est, *Orobus* coctus boues saginat. quod innuis-  
se *Virgilius* uidetur hoc uersu,

Eheu quàm pingui macer est mihi taurus in eruo.

*Euonymos* siue *Anonymos* putatur ea arbor esse, quæ  
dicitur vulgò *Fusaria*, Du fusain, quod fusi ad nen-  
dum ex ea arbore comparentur. Coqui etiam ueris-  
cula trassigendis lardo carnibus ex ea conficiunt. Eius  
siliquæ vulgò uocantur *Scrota* sacerdotum. Sunt qui  
eam arborem *anagyris* esse contendunt.

*Eupatorium*, *Agrimoine*: nomen habet (ut author  
est *Cicero*) ab *Eupatore* rege. Dicitur et *Hepatorium*  
et *Hepatitis*, quod hepatis præcipue medeatur.

*Euphrosynum*, Vide *Buglossum*.

*Fagus*, φάγος, Fouteau, ou Fayant. Sunt qui uocant  
Du hestre. Eius glandes nucleis haud absimiles; ante  
triangula inclusæ, Galliæ dicuntur *Des fannes*.

*Far* rufi coloris, fortasse illud est quod à *Colamel-*  
*la Vermiculini* dicitur. Vulgò *Frumentum rubrum*  
dicitur. Blé de Poulle.

*Far candidius*, quod putatur esse *Clusinum* *Colu-*  
*mellæ*, rura nostra uocant *Blance*, Vrunque vulgò  
c.ij.

uocatur Blé barbu.

Farrago, mistura ex secali & tritico, Mesture.

Ficus, Figuier.

Ficus Aegyptia, Idaea, Pelagica, & Alexandrina, quia non uisuntur apud nos, ideo nomen eis inditum non est. De Sycomoro dicemus suo loco.

Filix, Fougere.

Filicula, Polypodium quercinum praesertim.

Feniculum, Fenoil,  $\mu\epsilon\delta\rho\acute{\alpha}\theta\rho\upsilon$ .

Feniculum sylvestre, in Officinis, Foeniculum aegreste: & quia satiuo longè maius est, Hippomarathon dicitur.

Foenum Graecum, Vide Buceros.

Fragum, Fraize. Nescitur adhuc quo nomine arbor hunc fructum ferens Graecis dicta sit, nisi Rubus Idaeus humilis sit.

Praxinus, Fresne,  $\mu\epsilon\lambda\acute{\iota}\alpha$  Graecè: haec arbor apud Homerum celebratur, quod materia sit maximè idonea consuecendis hastis.

Frumētum, quicquid aristas mittit, & per hyemem in herba est.

Fumaria, Graecè  $\kappa\alpha\pi\acute{o}\varsigma$ , Fumeterre.

Fungi,  $\mu\acute{\upsilon}\kappa\eta\tau\epsilon\varsigma$ , Champignons. Fungi autem omnes, praeter  $\beta\omega\lambda\acute{\iota}\tau\alpha\varsigma$ , id est boletos, & quos  $\alpha\mu\alpha\acute{\iota}\tau\alpha\varsigma$  Pauli Aeginetae aetas uocabat, damnantur à medicis.

### G

Galeopsis, quae uulgo Herba cataria pingitur, uidetur esse Vrtica mortua, Labeo: alij putant esse Agripal-mam: In Officinis dicitur Scrofularia maior, Ficaria, Millemorbia. Nomen habet à Mustelae aspectu.

Galbanum,  $\chi\alpha\lambda\kappa\alpha\acute{\iota}\nu$ , succus est ferulae nascentis in

*Syria*: nomen retinet. Suo odore serpentes fugat, ut *Nicander* & *Maro* cecinerunt.

*Galion*, herba tenui radice, longa, rubente, caulibus gracilibus, floribus luteis, parvis, suave olentibus, decussatis, ut sit similis *Aparina*, unde dicitur uulgo *Aparine* parua, *Aspergula* minor, uulgo etiam dicitur *Florata*. Sic nominatur, quod (ut ait *Dioscorides*) in contrahendo lacte coaguli uiam habeat.

*Gallientrum* *Ruellij*, uidetur esse *Horminum* *Græcorum*.

*Genista*, *Genez*, ἀνάρπιον.

*Gentiana*, *Gentiane*: nascitur plurima in quibusdā locis *Galliæ*. Sic autem nominata est à *Gentio* *Illyriorū* rege. Dicitur & *Aloë* *Gallica*, ob radicem multū amarā. frequens est in Alpibus ad montem *D. Bernardi*.

*Geranij* prima species uulgo dicitur *Acus pastoris*: secunda, *Pes coruinus*. Nomen habet ἀπὸ τοῦ κεραιου, id est, à grue. Nam gruini capitis similitudo in summo eius plantæ capitulo uidetur.

*Gerontopogon*, id est, *Barba senis*, uulgo *Barba sacerdotis*, uel *Barba Dei*.

*Gethyum*, *Cepa non capitata*, *Ciboule*.

*Geum*, siue *Gethys*, *Mors a diable*. In aliquibus locis *Galliæ* dicitur *Salmonde*: ac si *Sanamundā* dicas.

*Gith*, *Græcæ* *Melanthiū*, uulgo *Nigella Romana*, *Nielle*, *Poiurette*, à *piperis* sapore.

*Gingidiū*, *Cerefolium*, *Cerfueil*, quasi χαρμόφυλλον, quod folijs luxuriet.

*Gladiolus*, *Græcæ* ἑρίφιον, *Glayeul*: folio est minore quàm *Iris*: *Theophrastus* ex eo nominatum putat, quod eius folia ensem referant. *Γαζα* apud *Theophrastum* c. iij.



interdum pugionē uertit. Columella Gladiolum Narcissi, uocat narcissi folium, gladioli formam habens.

Glastum, Græcè Isatis, Guede, ou Pastel.

Glaux, ostenditur folio simili Glycyrrhizæ. uideretur uerò omnino esse planta ea, quæ uulgò Mala domus dicitur, nisi quòd Glaux est herba maritima.

Glycyrrhiza, Latine Dulcis radix, Ragalisse.

Gnaphaliū, uulgò Cottonaria: alij uolunt esse Herbam cruciatam. Dicitur autem Gnaphaliū (authore Galeno) ex eo quòd ἀπὸ τοῦ γναφάλων, id est, pro tormentis uti liceat. Nam eius folia multa lanugine obducta sunt. Officinæ uocant Centumoculum.

Gongylis, uel Gongyle, Latine Rapum uel Rapa, Rabe. quæ in immensam crassitudinem in quibusdam locis crescit, ut rectè olim γογγυλίδας Laædæmonij γαστέρας (ut scribit Apollas apud Athenæum) uocarent.

Gramen, uulgò Dent de chien, quòd genicula radicis eius figura et albore caninum dentem referant. Vide Agrostis.

Gossipiū et Xylon Plinij, Arbre portāt le Cotton.

## H

Halicacabus, Vesicaria Halicacabus à Plinio, Alquequengi ab Arabibus dicitur, Galli Baguenaudes. Vide Solanum.

Halimus, Aureo Plin. quibusdam putatur ea arbuscula quæ in sepibus crescit, Blanche putain uulgus appellat: sed eos falli ex hoc conijcimus, quòd Halimus salso (ut Plinius ait) sapore sit, unde nomen inuenit.

Hastula regia, Vide Asphodelus.

Hebenus, Hebene.

Hedera, καδός, Lierre, siue ea muris, siue arboribus

hæreat, siue humi nascatur.

Hedysmos, uidetur esse ea *Mentha hortensis*, quæ caule est satis crasso: ea enim odoratissima est. Nam odor plâtæ (ut ait Plinius) fecit, ut eam herbam, quæ μίνδν prius dicebatur, ἡδύοσμον Græci uocarent.

Hedysarum, *Securidaca*, *Cornuette*. quibusdam dicitur *Cepa marina*.

*Helenium*, *Enula campana*. Nomen ex eo inuenit, quòd (ut ait Homerus) ex Helenes lachrymis in Helena insula natus sit, cuius radicem si quis comederit, omnium dolorum obliuiscitur.

*Helxine*, Celso *Herba muralis* dicitur, uulgo *Parietaria*, quòd muris adnascatur: dicitur etiam *Vræolaris*, quòd uræi ea extergeantur. *Parietaire*. Nicæder in *The-riacis Parthenij* primum, mox *Helxines* facta mentione, utranque contra uenenata laudauit. Quidam affirmant nomen deduci ἀπὸ τῆς ἑλκω, eò quòd asperitate sua, tenaci nexu uestes, quibus hæserit, ad se trahat: quanquam aliud uocis huius etymon scripsimus in uoce *Cissampelos*.

*Helxine cissampelos*, id est, *Hedera vinealis*, uulgo *Volubilis vinealis*.

*Helioscopius*, species *tithymali*, folio *portulacæ*, nascens in ruderibus ac uincis, & comas suas cum sole circumagens.

*Heliotropium* præsertim maius, uulgo *Herba cancri*, quòd flores in caudæ cancri similitudinem inflectantur, putatur à quibusdam esse *Cichorium agreste*, cuius flores cærulei sunt. neque ea est herba, quam uulgo *Soulcie* dicimus. Nomen ex eo habet, quòd folia eius solem ab Ortum in Occasum sequantur. *Celsus*  
c.iiij.

ob id herbam solarem appellat.

Hemerocalles, vulgò Liliū syluestre, uel marinū.

Hemionitis, vulgaris Scolopendria: Lingua autem æruina uidetur esse magis Phillitis. Sic dicta est Hemionitis, quòd muli ea delectentur.

Hesperis, vulgò Herba Gallica. Sunt qui uocant Giroflee: quòd Caryophyllum oleat.

Hyacinthus, Oignon de bois, ou Vassiet. Hyacinthi duplices sunt, albi & cærulei, ut ex hoc carmine Columellæ colligere licet,

Necnon uel niueos uel cæruleos hyacinthos. Sed albi ita intelligendi sunt, ut palescere incipiant cum adolefcunt. Cærulei ab eodem Columella dicuntur, & hyacinthi cælestis numinis, id est cærulei, & Iridem numen cæleste colorereferentes. Nicander in Theriacis scribit Hyacinthum puerū, quum Apollini colluderet, ab eo, disco ex imprudētia interfectum, atque ex pueri cruore, Apollinis commiseratione, herbā enatam esse. Alij dicunt hunc florē ex Aiæ sanguine natum, interpretanturque de eo Virgilianum illud,

Dic quibus in terris nascantur nomina regum

Inscripti flores. De hac re uide librum 13. Metamorphoseos Ouidij. Pausanias florem qui natus sit extincto Aiæ apud Salamina, credi refert editum primum nō hyacinthum, sed literis hyacintho similem uideri, ex candido rubentem, & lilio minorem.

Hydropiper, Piper aquaticum, planta est geniculata, flore spicato, in quo est semen Piperi simile: alijs uidetur Persicaria illa acris: alijs ea planta, quæ pro Eupatorio usurpatur.

Hieracium præsertim maius, Espece de Cichoree



fauuage. Quidam herbarij Cichoreā luteam aut cro-  
æam uocant. Nomen ex eo inuenit, quòd ἰέγρας, id  
est accipitres, Galliæ Sacres, succo huius herbæ (ut Pli-  
nius ait) oculorū obscuritatem discutiant. Apuleius scri-  
bit aquilam se in altum alis tollentem, ut rerū natu-  
rā cērtius contempletur, syluestrem lactucam euellere,  
cuiusque succo, oculo magnam claritatem comparare.

Hieraciū minus, in quibusdā Officinis dicitur Dens  
leonis: in alijs Barbuta, Taraxacon, & Altara.

Heptaphyllon, Tormentilla.

Hyoscyamus, Vide Alterum.

Hypericum, Millepertuis.

Hippoglosson, putatur à Ruellio Bonifacia Italorū.  
Quidam affirmant esse eandem plantam cum Lauro  
Alexandrina. In quibusdā locis Galliæ dicitur Lin-  
gua pagana: significat ad uerbum Linguam equi.

Hippolapathum, La pabelle, La patience. In qua  
uocē, ἰππο αὐγέ, quasi dicas magnum Lapathum: ut  
etiam in sequenti dictione.

Hippomarathrum, Magnum fœniculum syluestre,  
& Erraticum.

Holostium, uel (ut alij scribunt) Holosteon, Molle  
gramen, uel Denticulus canis. Nominata est hæc plan-  
ta κατ' ἀπὸ πέρας, quòd sit sine duritie.

Horminum, Toute bonne, Horuala. Planta autem  
hæc duplex est, satina & agrestis.

Hyssopus, Ilope.

# I

Iasminum, Iasmin: ea herba nuper ex Italia ad-  
uecta est: ab Actuario autem Zambacus dicitur. unde  
oleum Zambacium dictum est.

*Ilex glandifera*, quæ gerit glandem vulgari similem, sed multò efficaciorẽ glandibus quercus. Ea autem *Ilex* rara est in Gallia.

*Ilex conifera*, duplex est: alia *Quisquilium* dicta est, gerens coctum baphicum, id est, granum tinctoriũ, Escarlatte, quæ frequens est in Gallia Narbonensi. Alia dicitur *Aquisfolia*, Galliæ *Du houx*. Sunt qui referunt *περὶ σπινθ*, id est, subiferam arborem, ad ilicem.

*Intybus* uel *intubus*, uel *αἰς*, est nomen cõmune quo *Scariolas*, *Ambubaias*, *Cichoria*, *Endiuia* intelligimus. *Virgilius* per -amaris, *intuba* fibris, intellexit, auctore *Hermolao*, genus illud *intubi*, quod *πικρὶς* dicitur.

*Inula*, uide *Helenium*.

*Iouis barba*, Vide *Aeiζoon*.

*Iouis glans*, putatur esse castanea, quæ à *Galeno* dicitur *τὸ κάστανον*.

*Irio*, Vide *Erisimum*.

*Iris*, Flambe: sic dicitur à multiplici colore quĩ spectatur in uno flore. Flambe autem Galliæ appellatur, quòd maximè exalefaciat.

*Isatis* (ut *Cæsar* ait) à Barbaris sua corpora ea herba tingentibus *Glastum* dicebatur. *Vitruuius* lib. 7. uidetur luteã uocasse. Antiquiores Græci & Latini inter syluestres *Lactucas* eam numerarunt. *Plinius* longissimè de ea egit cap. 7. lib. 20. Tinctores nũc habent crassiorẽ farinam *Isatidis*, quam uocant *Guedam*, & nobiliorem, quam *pastellum* appellant.

*Isopyrum*, est genus *Phaseolorum*, folio aniso simili, semine gustu referente *Melanthium*.

*Iuglans nux*, Noix commune. Dicitur *nux* Indica ab *Actuario* in *Diasatyrio*.

Iuncus, χοῖνος, quod ex eo funes fiant: multiplex autem est, unus crassitudine et magnitudine insigni, fungosâque medulla, in aquis uiuens, Holoſchoenos, Plinio Mariscus à magnitudine, ut ficus Mariscæ, dicitur. alius ex quo fiunt ellychnia quæ Scirpum appellamus. Alius est Melancranis, id est, capitulum nigrum habens, gerens fructum racemorum coherentium modo. Additur his Oxyschoenos, id est acutus iuncus, qui nihil aliud est quàm iuncus marinus.

Iuniperus, Geneure, ἄρκυδος, uel ἄρκυθῆς. Gummi Iuniperi. ab Hermolao Barbaro dicitur Vernigo: Galli Vernix appellant, quod in usu multo est scriptoribus et pictoribus.

## L

Labrum Veneris, ἀφροδίτης λουτρῶν: uide Dipsacus. Duplex est hæc planta: Satina, qui est le Chardon de bonnetier: Syluestris, uulgò Virga pastoris.

Lactuca satina, Græcè θρίδαξ, uel θρίδακίνη: à recentioribus Græcis μαρούλιον, Lactue. Theophrastus Lactucarum tria genera scribit, πλατύκαυλον, καὶ εὐοχύλοκαυλον, καὶ τεῖνον, τὸ λακωνικόν: id est, unum lati caulis (ὡς ἐρίοις χεῖναι καὶ θυραῖς κηπουρικαῖς, id est, adeò ut hortorū ostiola ex his fiant) alterum rotundi caulis: tertium Laconicum. Hæc herba est multum salubris, quod his uersibus Columella confirmat,  
Iámque salutari properet lactuca sapore,  
Tristia quæ releuet longi fastidia morbi.

Ibicus Pythagoræus apud Athenæū hanc plantam à Pythagoræis ἄνοῦχον uocatam scribit, quod frigidityte sua homines πρὸς τὰ ἀφροδίτια ἐκλύπει efficeret. Cui nō dissimile est quod Callimachus apud eun-



dem authorem de Venere scripsit, quæ Adonin mortuum lactucæ folio texit.

Lactuca sessilis, Capitata, Laconia, Lactue pōmee. Sunt aliæ Lactucarū tum à colore, tum à genere apud Columellam differentiæ, quas ex authore ipso petito.

Lactuca sylvestris, sponte nascent, vulgò dicitur Taraxacum: alij, meo quidem iudicio rectè, pro sylvestri Lactuca, eam herbam accipiūt, quæ Endivia vera dicitur. Alij Chondryllam lactucæ sylvestris etiam speciem eam uolunt esse, quam Galliæ Lacteron nominamus. Lactuca autē, authore Palladio, ex eo dicta est, quòd lacte, bono eo quidem, & ad multa utili, præsertim si ex sylvestri eductum fuerit, abundet.

Ladanum nomen retinet in Officinis. Est autem is succus, quo capræ, dum Cistum fruticem depascuntur, barbas ac uillos imbuunt: unde postea homines depectunt, quod Ladanum dicitur.

Lampasæ, Sanue. Hoc olere (ut Plinius ait) Cæsariani milites ad Dirrhachiū uixere, eique in triumpho iocularibus carminibus exprobrauere.

Lanaria herba, Græcè Struthion, vulgò Herba fullonum: & in Officinis Saponaria. hac planta sic utebantur antiqui ad lanas æsypo repurgandas, ut quæ eo sudore repurgatæ non sint, à Græcis ἀσπύδιον dicantur.

Lappa maior, ὤρεον, Personata: quòd ex ea personæ fieret in theatris, Glouteron, vulgò Bardana.

Lappa minor, Vide Arction. Habet ea herba echinos inhaerentes uestibus. Des graterons.

Lapathi primum genus uidetur id esse, quod vulgò De la patience dicimus. Secundum genus est La-

pathum rotūdum uulgo dictum, magnitudine mediū inter Oxalidem & Hippolapathū. & id uidetur esse Rhabarbarū Cartusianorū. Tertiū genus est Oxalis Turonica, De l'Ozeille de Tours. Quartum est uulgaris nostra Oxalis, nostre Ozeille commune. Lapathū autem dicitur ἀπὸ τῆς λαπαίνω, id est, inanire & uacuare. Omnium siquidem generum Lapathi folijs decoctis alius mollitur. Rumex Latine dicitur quo nomine propriè nostra Oxalis appellanda est.

Laser, & Laserpitiū, σίλφιον, Beniouin, quod ex Cyrenica prouincia olim præstantissimū aduehebatur, unde Catullus Cyrenas laserpiaferas appellauit. Et Palladius laser, opon Cyrenaicū uocat, quāquam ἐπὶ τῷ nomine laser κατ' ἔξοχὴν intelligimus. Hodie ē Taprobana maris Indici insula omnium maxima (ut ait Ludouicus Romanus patricius) optimum conuehitur.

Lathyrus, uulgo Cataputia minor, Esurge. Sunt qui putent esse Tithymali speciem, tum quod similem ei succum habeat, tum quod eodem modo purget.

Lauer, Græcè Sion: Berle, Homerus αἰάπιο in aquis nasci canit, Ἀμφὶ δὲ λευκῶνες μαλακὰ ὀσῖς, ἢ δὲ σελίνου.

Lens, species leguminis, Græcis, quia edendo est, φακὸς ἐδωφόρος dicitur, Lentille.

Lens palustris, etiā Gallico nomine Létille dicitur.

Leontopetalon, uulgo Patta leonis: Galliæ De la pommelee: Itali Papauerculum uocant.

Lentopodion Ruellio putatur esse Cruciatā nostra, alijs Calendula: frequens est in hortis. eritum autem olet sinapi, & illius ac piperis acrimoniam habet.

Lepidium, uulgu Gallorum; Passe rage uocat. Paulus Aegineta Lepidium, Iberidem, & ἀρχιόκαρδαμον

eandem plantam facit. Cæterū Lepidium dictum est, quod auti impositum, tam ualide exulceret, ut à cute, λεπίδες, id est, squamæ pellantur, quod Columella in carmine suo æcanit:

Deiectura quidem fronti data signa fucorum,  
Vimque suam iccirco profitetur nomine Graio.

Utebatur eodē antiquitas, quod etiam nū̄ tota AEGYPTUS & Syria seruat ad adiūciendum lacti acorem, consiciēdūque id quod Oxygala, id est, lac acidum Græci uocant. lege Columellam lib. 13. cap. 8.

Leucacantha, species cardui, folia lactuæa habentis, maculis albis conspersa, appellatur uulgò Carduus beatæ Mariæ.

Leucoion Dioscoridis, est nostra Gariophyllata, nostre Giroflee. Officinæ autem Mauritana uoce Kiri appellant: quanquam luteum tantūm hoc nomine appellandū quibusdam placet. Leucoion Theophrasti Massario est, quod circa Natalem CHRISTI, etiam summis frigoribus floret passim in syluis, nunc etiam in hortis. Cæterum quanquam uox Leucoion albam uiolam tantūm significat, tamen hoc nomine omnes alij colores indicantur.

Libanotis, Rosmarin: sic dicitur quod λεβάνου, id est thuris, odorem habeat.

Ligusticum, quibusdam placet eam esse herbā, quæ uulgò De-la leuesche dicitur, sed rectius dicimus Ligusticum ignorari. Nam Smyrniūm nostræ Leueschie magis conuenit. ληγυστικόν uel cū Galeno λεβυστικόν, Leoniceus & Musa uocant Radicē imperatoriam. nomen autem à Liguria inuenit, quæ ea planta sic olim abundabat, ut eius semine pro pipere uteretur.



Ligustrum, Du troesne. In Hetruria nunc corrupte Lunisticum.

Lilium, Lis, Iunonia rosa.

Liliastrum, Lilium sylvestre, Hemerocalles, vulgò Lilium marinum.

Limonium, Beta sylvestris, Bete de pré, & sauua-ge: proxime accedit ad Elleborum.

Linozostis, vulgò Mercurialis: M. Cato hac herba in deicienda aluo uti præcipit. Græci eam σμὸς πῖον ex eo appellasse creduntur, quòd numinis cuiusdam ui, fœminæ tum trita, tum pota, aut post purgationes fœminarum genitalibus apposita, ut fœminæ concipiantur, faciat: mascula uerò contrà, mares.

Linum, Lin.

Lysimachia, vulgò uocatur in quibusdā locis Corneola, in alijs Falsia aquatica. in alijs locis Galliæ dicitur Chasse boffe, quòd multum efficax esse aduersus pestem credatur: frequens est in Cenomanensi agro. In aliquibus locis etiā dicitur Salicaria. Appellatā autem à Lysimacho rege alij scribunt, alij uerò ex eo nomē inuenisse putant, quòd discordantibus iumentis, iugo ab antiquis imposita, eorū asperitatem coerceret.

Lithospermon, vulgus herbariorum Milium solis. Galliæ Grenil, uox ad uerbum significat Lapidosum semen.

Lolium, Vide Aera.

Lonchitis, à vulgo herbariorum dicitur Lanceolata, quod etiam Græcum nomen indicat.

Lotus arbor, Alisier: Itali uocant Amarenum Pongeranum. huius fructus describitur ab Homero libro 9. Odyss.

Lotus herba, putatur esse Trifolium minus quod nascitur in pratis. Describitur alia Lotus ab Athenæo libro 14. Dipnosophist.

Lupinus, Σέπυος, Lupin, amarissimus est: ob id tristes Lupinos Virgilius appellat.

Lupus salictarius, Lupulus, Houbelon.

Lychnis fatiua præsertim, Rosa Græca uel Græcula Plinij. à Γαζα apud Theophrastum, Lucerna conuertitur. In quibusdam locis Galliæ appellatur Caryophyllata syluestris, Giroflee sauage. Alia rura uocant Chandelle de nostre dame. Lychnidem autem ex eo argumento appellauerunt Græci, quo nauis in mari sæpe uisum piscem Lucernam ueteres Romani uocauerunt, ignea per os exerta lingua tranquillis noctibus relucentem. Nam noctibus hic flos fulgere uidetur, & ignis quodam fulgore uidentium oculos in se conuertit.

Lycopsin quibusdam placet esse Cynoglosson herbariorum. herba est ex Anchusarum genere, quam Plinius seorsum à reliquis anchusis de Lycopsi egit, quod antè & Nicander fecit.

Lygos, Latine Vitex, Agnus castus, Γαζα uertit Amerinam. Lygos autem ex eo dicitur, quòd maximè lenta & flexilis sit: quanquam nomen lygos Græcis commune est omnibus, quibus in opere rustico ad uincula utimur. Agnum autem appellarunt, quoniam in Thesmophorijs, Cereris sacro, quod Athenis à mulieribus fiebat, castitatem custodientes mulieres folijs eius cubitus sibi sternerent, expertæ, aut à peritionibus doctæ uiticem calore suo inflationes soluere, ideòque Veneris impetus faciliè inhibere.

## M

*Malobathrum*, folium simpliciter olim à Græcis dictum est, ut ex Plutarchi commentario, quod bruta ratione utuntur, colligere licet, à qua appellatione *Malobathrinum unguentum*, foliatum Martiali dictum est: nunc folium Indicum dicitur. Lingua uerò Mauritani-  
rum *Tembul* dicitur.

*Malicorium*, Testa mali granati.

*Malua*, *μαλάχην*, uel *μελόχην*, quod nomen Columella in horto retinuit, *Maulue*. Nomen autem à mollienda aluo habet, unde molles *maluæ* Martiali dicuntur. Hæc herba folia ad solem circumagit, unde *Helios-  
trophos* ab *Apuleio* dicitur.

*Malua sativa*, Rose d'oultre mer: *δενδρομαλάχην*, id est, arborescens *malua*, dici potest.

*Malus serotina*, Pommier tardif.

*Malus præcox*, Pommier hastif, qualis est quæ *Persica Treacica* fert, *Peschès de Troye*, & *Auant-  
pesches*.

*Malus agrestis*, Pommier sauage.

*Malus generosa*, Pommier franc.

*Malus insita*, Pommier enté.

*Malus bifera*, Pommier de deux portees.

*Malus Cydonia*, vng Coignier.

*Malus Armeniaca*, vng Arbricotier.

*Malus Persica*, vng Peschier.

*Malus Punica*, vng Grenadier.

*Malus Medica*, vng Orangier.

*Malus citrea*, vng Citronnier.

*Mandragoras*, Gallie Mandragore, Mandegloire. Qui *Mandragoram* quotidie circunferunt *Argyrea*,  
d. i.



iactant que tanto periculo effodi humana forma, ignara plebi eam ostendentes, ex uno à Pythagora nomine anthropomorphos ei indito, mēdacij sui occasionem arripuerunt. Neque enim uox illa aliud, quàm humanae formae plantam significat. Nam duas aut tres radices inuicem complicatas in modum crurum humanorum habet. Accessit & Pythagorae Columella, qui in carmine suo ita cecinit:

Quauis semihominis uesano gramine foeta  
Mandragorae pariat flores, mœstamque cicutam.  
Non defuerunt illis etiam in iactanda, cum foditur  
Mandragoras, religione Theophrastus in Græcis, Plinius uerò in Latinis, quorum commentarios adito.

Mandragoras, mas, dicitur μάειον: foemina, Σπίδα-  
νίας: Hermolaus Barbarus refert Mala insana, Pommes d'amours, ad Mandragoram.

Marathrum, Fenoil.

Marrubium, μαρρόιον: nomen retinet in Officinis,  
& apud uulgus. quanquam in locis quibusdam Marrouche appellatur.

Marum à quibusdā putatur esse herba similis Origano: quibusdam placet esse herbam, quæ uulgò Marfic dicitur.

Meconium, Papauer, Pauot.

Melanthiū, Nigella Romana, Vide Gith. Nielle, ou Poiurette, à sapore piperis. Nomen habet à nigro flore, quum tamen cæruleū habeat, semen uerò nigrum: unde rectius μαγανόπεπρον diceretur.

Melanthium sylvestre, Nigellastrum, Githago, Des aiesnes.

Mellissophyllon, De la melisse: dicitur & Citrargo

quibusdam, quòd crita citri odorem referat.

Melilotos, Sertæ campanica Catonis, Sertula Campana Celsi & Plinij Melilotus.

Mentha, μίνθη: De la mente. Vide Hedyosmos. Dicitur & Balsamum.

Menthastrum est folijs lanuginosioribus, & simile est Sisymbrio, id est Menthæ aquaticæ.

Mespilus, secundum Dioscoridem, arbor est aculeata, ferens tricoctum fructum, qualis est quæ fructum Acharolum Neapolitanis dictum profert. Mespilus autem nostra est uera Epimelis Dioscoridis.

Myagrion, ὑδάμνρον, De la Cameline. Blé frimé. Frequens est in Campania.

Myosotis descripta à Dioscoride longè differt ab Alsine nostra, quam vulgus Mourron & Coquille de prestre appellat. Nam quæ descriptio est Myosotidos apud Dioscoridem, Bipinellam nostram prope modum exprimit.

Myrica, Tamarix, Tamarin: Officinis, Tamariscus.

Myriophyllon, Millefoliū. Hetruria hoc nomine appellat herbam in pratis tenuē, à lateribus capillamēti modo foliosam, eximij usus ad vulnera. Boñ enim neros uomere abscissos ea herba, additæ axungia, solidari affirmant. Millefueille. Aliud est Millefolium Græcis χλιόφυλλον inter sideritidas. Est & σπαπώτης χλιόφυλλος, quē docti quidam Cuminum sylvestre, quòd eius folia Cumini folijs similia sint, esse putant.

Myrtidanum alijs dicitur soboles adnata trunco myrti, quæ alio nomine dicitur μωπίς. alijs significat fila quæ inuoluunt Myrtum.

Myrtus, μωρσίον, uel μωρρίον, Meurte. Murta Catoni d.ij.

Et Myrta Varroni, sunt baccae Myrti, Græcè μύρτα, Officinæ Myrtilla uocant.

Myrrhis, secundum Manardum, est nostrum Cerfolium, sed id nō est uerisimile. Plinius facit speciem Gerani: alijs placet esse Pedem columbinum. Officinis dicitur Cicutaria: uulgus Gallicū uocat Persil d'asne. Nomen ex eo habet, quod tota Myrrham oleat.

Morus, μωρεά, Meurier.

Moschocaryon, Noix muscade.

Muscus arborum, Vide Bryon.

## N

Napus, βουβιας, Nauet.

Narcissus qui hīc ostenditur, à Plinio refertur ad Liliū. Visus est hīc Narcissus uiolaceo flore, qui uerus Narcissus Theophrasti putatur esse. Quidam etiā Petiliū florē ad narcissum referunt. Narcissus autem, authore Plinio, nō à fabuloso puero, sed à torpore, qui Græcè νάρκη dicitur, appellatus est. Dolores enim capitis Et grauitates suo odore efficit. Quod ipsum Plutarchus scribit Sympos. 3. ob id Sophocles deorū subterraneorum coronamentum facit.

Nardus Indica, Aspic d'oultre mer: quanquam hæc simpliciter Nardus interdum dicitur. appellant quidam Et Nardi spicam, uel uno nomine νάρδα-χον, quod sit admodū humilis, Et nihil nisi spica cum radice. Quæ hīc ostenditur in Officinis, nihil aliud est, quàm inanis quedam festuca.

Nardus Celtica, Aspic, Lauande.

Nasturtium, νάρδαμον, Cresson alenois. Nasturtium, authore Plinio Et Varrone, dicitur à torquendis naribus: νάρδαμον autem ἐπὶ τῆς νάρδας, quod mul-



tum ualeat in syncope cardiaca, uel quasi καρδιακόν, quod ui sua & acrimonia caput tentet.

Nepeta, L'herbe au chat. Vide Calamintha.

Nymphæa, Cacabus Veneris, & Papauer palustre Plinij: Nenuphar uerò Arabū. nascitur in stagnis & paludibus gerens semen in calyce simili lucernæ æreæ. Creditur sic quondam dicta fuisse, quod aquosa amet loca.

Nux auellana, Corylus, vng Couldre.

Nux iuglans, vng Noyer.

Nux Græca, Amandier.

O

Ocymum, recentioribus Græcis βασιλικόν, quod nomen retinuius, Baselic eam herbam uocantes. Sic autem quibusdam dicitur à nascendi celeritate: siquidem tertio à satū die emicat. Quod tamē uerius Ocymo pabuli & ferraginis generi, Dragee aux cheuaulx uulgo uocato conuenire uidetur. proinde sunt qui Columellam sequentes Οζimum scribunt, ὀζω, quod redolere significat, quoniam herba tota suauissimum spirat odorem, à quo basilica utique & regia domo dignum Basilicum appellatur.

Ocymastrum, Ocymoeides, uulgo Potularia, Iasia alba, Baselic sauuage.

OEnāthe in Officinis dicitur Filipēdula, & Saxifraga rubea. dicta est OEnanthe, quod cū uino floreat.

Alia est OEnanthe, Flos utis syluestris.

Olea, Oliuier.

Olusatrum, Vide Hipposelinum.

Onobrychis nomen retinet. significat ad uerbum Asini delictum.

Ononis, Vide Anonis.

Onosma est ea Anchusæ species, quæ est sine folijs  
et caule, et cuius radix rubet.

Ophioscorodon est Allium sylvestre, ut quod ostenditur ex uerbis et pratis. Ad uerbum significat Anguinum allium: in quibusdam Officinis dicitur Vrsinum allium. Lege Scorodon.

Orchis, Vide Satyrium.

Origanum, Mariolaine d'Angleterre, alij Mario-laine bastarde. Sunt qui Satureiam semper uiuentem referunt ad Origanum. Plinius uocat Cunilam capitatam.

Orbiculata mala Varronis uidentur esse nostra po-ma Capenduta.

Oryza, Ris.

Ornus nomen Gallicum non habet: à quibusdam dicitur Fresne champestre.

Orobanche Erui angina à rusticis dicitur, Tigne. Quidam Cuscutam uocant, uide Epithymum.

Orobis, Eruium, Des ers in Gallia Narbonensi. Vide Eruium.

Osyris, uulgo Linaria maior et minor.

Othōna, uidetur esse Memintha Pharmacopolarū.

Oxalis, Vide Lapathum.

Oxyacantha, uel Oxyacanthus, ut Theophrastus in Officinis Berberis: et uulgo, Espine vinette. ad uerbum significat Acutam spinam. Frutex Ribes Arabibus dictus, et Gallico sermone Grozelier rouge appellatus, huic est congener.

Oxytriphylon, uulgo dicitur Panis cuculi: in Officinis Acetosum triphylon, et Alleluya dicitur.

## P

*Paliurus* putatur à Ruellio Aulbespine, sed falso. Nam translatus est huc ex Italia *Paliurus acutis* adeò spinis, ut uerum esse comperiamus quod de eo à Virgilio & Columella scriptum est. hic frutex in Narbonensi Gallia dicitur *Arnagus*.

*Palma*, *Palme*, *φοῖνιξ*, quæ uox Græca arborem & fructum, quem Suetonius in Claudio *Palmulam* uocat, significat. nomen autem habet à colore pomi: *φοῖνιξ* enim & *φοινίκευ*, puniceo colore rubere est. de *Dactylis* uide suo loco.

*Panaces*, ad uerbū significat ualens aduersus omnes morbos: quod nomen, quanquā cōmune est Centauro, *Ligustico*, *Tithymallo*, *Origano*, tamen propriè tribuitur *Panaci*. Non est uerisimile, plantā quam Gallicè *Panez* dicimus, esse *Panaces*: tamē *Panaces* *Asclepium* magnam habet similitudinem cum nostris *Panacibus*.

*Panaces* *Chironiū* ab *Apuleio* dicitur, *Emula cāpana*.

*Panicū*, Du *panic*, ὁ ἕνθος, uel ὁ ῥόγινος. *Theop.* Latini ei nomē à *paniculis*, in quibus semē est, indiderūt.

*Papauer satium*, *μῆλον ἡμερος*, Du *pauot*. Ferūt *Cererem* non ad cibū, sed ad leuandum somno pro amissa filia dolorē, *papauere* usam fuisse, & in luctus fortunæque suæ memoriam mortalibus id ostendisse. quod frugis maleficium sensit *Virgilius*, ita canens, *Vrunt lethæo perfusa papauera somno*.

*Papauer erraticum*, *μῆλον ποίας*. *Rura* uocant *Coquelicoz*, ou *Ponceau*. *Papauer rhæas* à Græcis dicitur, quòd flos uel lenissima aura agitatius fluat.

*Papauer corniculatum*, *μῆλον κερατῆς*, nomen retinet in *Officinis*.



Papauer spumeum *μυκων ἀφρώδης*, uidetur esse humillimum genus papaueris. Spumeum autem dicitur, authore Galeno, quod totum album sit, & spumeum.

Pardalianches, in quibusdā Officinis dicitur Vuarinuerſa & Vulpina: alijs uidetur uulgò dicta Luparia. uide *Lycotomum*.

Parietaria, uide *Helxine*.

Paronychia putatur esse quibusdam ea, quam Itali à folijs noctu lucentibus, Lunariam appellant.

Parthenium est ambiguum apud Græcos: aliquando enim, ut placet Hieronymo Trago, est *Anthemis*, Camomille: aliquando Mercurialis: aliquando *Parietaria*, ut Celſo & Gaſſæ, qui muralem Parthenion interpretantur: quibusdā placet esse *Matricaria*, *Espargoutte*: alijs dicitur *Comula foetida*. hic accipimus Parthenium pro *Matricaria* & *Espargoutte*.

*Pastinaca hortensis*, *σαφυλῖνος κηπάρος*, Carrotte.

*Pastinaca sylvestris*, *σαφυλῖνος ἀγριος*, nihil aliud est, quàm *Daucus*, *Pastenade*. Cæterū obseruandū *σαφυλῖνον* uel *ἀσαφυλῖνον* simpliciter, Græcis significare satiuam *Pastinacam*, quomodo *Columella* cecinit: Lætetur, mollémque sinum *staphylinus* inumbret. Syluestrem autem significant adiectione nominis *ἀγριος*, uel nomine *δαύκου* exprimunt.

*Pentaphyllon* putatur *Laoniceno*, *Manardo*, & *Ruelio* ea planta, quæ nunc à nobis *Tormentilla* dicitur, cui *Pentaphylli* descriptio conuenit.

*Pæonia*, *Piuoine*, *Rose nostre dame*. Multum ualeat mas præsertim, aduersus *Epilepsiam*.

*Peplos*, uulgò *Reueille* matin des vignes. In quibusdā Officinis dicitur *Esula rotunda*.

Pepo est uox communis, qua intelliguntur fructus qui maturitate sua mutes sunt, & amissa soliditate sua flaccescunt & tenerescunt, à uerbo πεπαυειν, id est, maturescere: tamen propriè est quem uocamus Pepon & Surpepon. Sunt & Melopepones à mali rotunditate, Columellæ dicti, quos Melones & Sucrinos uulgo uocamus.

Periclimentum, uulgo Caprifolium, Matrifylua, & Vinciboscum, Volucrum maius.

Personata, Vide Lappa.

Petasites à Petaso dicitur, quòd eius folio caput operiri nõ secus ac galero possit. Nomè retinet in Officinis.

Petilius flos potest esse nostrum Oeuillet d'Inde.

Peucedamũ, uulgo Fœniculum porcinũ. Appellatum est autè à Pinu, quæ Græcis πύκνι dicitur, cui folio par est, unde Latini posteriores Pinastellũ uocauerũt.

Phæa, Vide Lenticula.

Phalangium à nobis ignoratur, nisi sit herbula, quæ passim ostenditur albo flore, folio Alsines, sed lanuginoso. Nomen ex eo inuenit, quòd Phalangiorum moribus medeatur.

Phasiolus, Vide Similax.

Phœnicobalanus, Dactylus maturatus in sole: nam nomine βελαίου, id est, glandis Græci palmæ fructum etiam comprehendunt.

Philanthropos, uide Aparine.

Phillitis alijs uocatur Rumex muralis, alijs Osmunda: uerisimilius est esse Linguam æruinam.

Phu, Valeriana maior.

Piæa, πύκνι, Pin communeement moindre que le Pin qui croist par les iardins. Vulgo Pinasse. .

Phlomis, Verbasca, in Officinis Tapfus barbatus. Sunt qui Candelam regis, Candelariā, Lanariāque nominent. uulguſ Gallicum appellat Bouillon blanc. Græci ex eo ei nomen indiderunt, quòd ea planta pro Ellychnijs uti possimus: nam caules pingui aliquo illiti pro lucernis nobis esse possunt.

Phlomis, Lychnis, Thryallis, uulgò Cadelaria, quòd ex ea fiant ellychnia.

Pinus, πίνος, Pin.

Pityides sunt nuclei qui sunt in nucibus pini, & picæ arboris.

Pinaster, σπόκιλος, πύκη, Pin sauuage.

Piper, πείπερ, Poyure.

Piperitis alijs Piper Indicum dicitur: alijs Cardamomu genus putatur.

Pyrethrum, uulgò Pes Alexandrinus. Nomen ab ignea & caustica ui habet, quia mansu saliuam potētius, quàm pro caloris modo elicit, unde Salinaris quoque Latinis dicitur.

Pirus, Poirier, ἄπιος: fructus, ἄπιον, ὄρχην, uel ὄχην: quæ duo uocabula postrema significant potius syluestre pirum, ὅθεν τὸ ὄρχην, à strangulando.

Non habemus nomina Ceritijs, Calculosis, Lolianis, Lannijs, Milesijs, Myrteis, Orbiculatis, & alijs innumeris quæ apud Columellam sunt, respondentia pira: sed coacti sumus nomina à figura, sapore, & interdum à loco fingere, Bonchrestiana, Mariana, Muscata, Bicipitia, Turbinatiora, Martiniana, Finora, Bergamotia, Strangulanea.

Piromela, Pommes poires.

Pistacia à Pharmacopolis uocantur Phistici. Nican-

*Pyrozan  
gentia*



der in Theriacis uocat Psittacia, quæ aduersus serpentes ualere dicit. Visitur Pistacium in hortis D. Cardinalis Bellaij.

Pityusa Aethuarij uidetur esse Turbith, uel Turpetum Mesuæ. Turbith autem Serapionis & Mesuæ uidetur Tripoliū Dioscoridis. Turbith uerò illud, quod est in Officinis Pharmacopolarum, uidetur esse radix Tichymalli myrtitæ.

Plantago, ὀρνόγλωσσον, Lingua agni, Plantain.

Plantago minor, uulgò Læceolata, Arnoglossum Officinarum est plantago ea, quæ habet folia rotundiora & hirsutiora.

Platanus, Vng plat, De la plane. Sic appellata uidetur à foliorum latitudine. Visitur nunc pulcherrima Platanus prope ædem D. Hilarij apud Pictauos. Summa huius arboris olim commendatio fuit, solem æstatibus arcere, per hyemes admittere.

Polemonia, uel Polemonium, à quibusdam putatur esse Ambrosia uulgaris, id est Salvia syluestris, Saulge de bois. In quibusdam Officinis dicitur, Behen album. Hæc herba cognita est Cenomanis, pestifugam eam putantibus. Quibusdam placet dictam esse hanc herbam à certamine, quod reges de eius inuentione iniierunt: alijs ex eo, quod pugnet aduersus uenena.

Polygonon fœmina crescit in aquis, folijs est pini, & geniculis caudæ equinæ.

Polygonatum mas, uulgò Sigillum Salomonis. No men ex eo habet, quod radix frequentibus geniculorum nodis tumeat. Inueniuntur duo genera, alterum folijs latioribus, alterum multò angustioribus. Itali uocant Fraxinellam.

*Polygonon mas, Sanguinaria: In Officinis Centinodia & Corrigiola appellatur. Dicitur & hinc herba Sancti Innocētis: appellata autem ita est à multis geniculis, quibus nodosa est.*

*Polypodium, folium habet Filicis. Dicitur autem Polypodium, quòd in radice multos cirros polypodum modo habeat.*

*Polium à canitie dictum est. Herbula enim est in summo canitiem quandam habens. Vocabatur autem à Romanis, auctore Scribonio Largo, Tinearìa. Nam, ut ait Theophrastus, τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς ἰατροῖς ἀγαθόν: id est, bonum est aduersus tineas quæ in uestibus sunt. amarum enim usque adeo est, ut cum Græci scriptores maioris amaritudinis indicatione aliqua uti uellent, à Polio exemplū sumerent, semperque id βαρύνον, id est, grauiter olens appellarent. Nicander in Theriacis aduersus uenenata laudat. Affertur nunc è Gallia Narbonensi Polium, canos hominis in summo pendentes, præsentī quadam imagine ostendens.*

*Polytrichon est Adianti ea species, quæ similis Filici folia lenticulæ habet. Nomen retinet quod ex eo inditum est ei, quòd capillos multos & densos faciat, eorumque defluuia expleat. Vide Adiantum.*

*Pomus, Pommier.*

*Poma Serica, siue Sirica Columellæ, & Galeni Zīpha, in Gallia Narbonēsi Guindola uocantur, Pharmacopolæ Iuiubas uocant.*

*Poma petisfa, possunt esse nostra poma Paradisiana.*

*Poma purpurea Columellæ, possunt esse nostra poma De rouveau.*

*Poma illa Māliana, Mariana, Claudiana, Melap-*

*poma 9<sup>na</sup>*

pia, Appiana, Picena, Tiburtina, Amerina, Corinthiaca uix sibi nunc respondentia nomina habent.

Poma nostra sunt Capenduta, Ratelliana, Renetia, Passipoma, Paradisiana, Franzetura, & similia.

Populus duplex: alba quæ Græcè λευκή dicitur: nigra quæ αἴγυρος, ut Dioscorid. uel αἴχρος, ut Galen. de qua iam dictū est in dictione AEgrus. utraque Gallico nomine dicitur Peuplier. Sunt qui & Tremulam dictam arborē, id est Tremble, speciem populi esse uelint. Ex populo alba fluit, ut quibusdā placet, lachryma, ἡλεχτρῶν Græcis dicta, Latinis Succinum, Gallis Ambra.

Portulaca, πορράχη, Pourpié, quasi dicas Poullepied. Nam serenus hanc plantam Pulli pedem appellat, quod ea præsertim quæ in uincis nascitur, figura pedem pulli gallinæ referat. Vide Andrachne.

Poterium, ut descriptum est à Dioscoride, uidetur esse nostre Grozelier.

Prassium, Vide Marrubium.

Prunus, Prunier, κοκκύμηλέα: fructus, Prunū, κοκκύμηλον. Nicander apud Athēnæum appellat μῆλον κοκκύρος. Quidam κοκκύμηλα per barbaralexin dicta putant, quasi coquimala, propterea quod uis præcipua deiiciendi eis insit.

Prunus syluestris, Vng prunelier. Hanc arborem Virgilius spinum uocasse uidetur,

- spinos iam pruna ferentes. quam arborem in Asia πηγύμων uocatam Galenus scribit.

Pruna hordeacia antiquorū esse possunt quæ nunc cerea dicimus.

Pruna Asinina nunc dicuntur, Des poitrons, ou Des dauesnes.



*Pruna Armeniaca*, Arbricos.

*Pruna Damasceña*, Prunes de Damas.

*Prunorum* aliud est genus minus, quod Græci recentiores Myxon et Myxarion dixerunt ἀπὸ τῆς μύξης, à muco et lentore, qui multus inhæret his prunis. vulgus Pharmacopolarum nunc Sebestas. Cæterum hi acini Sebastii ab Augusti honore appellabantur in Syria, ut Hermolaus scribit.

*Pruna Iberica* possunt esse quæ Pertigona vulgò dicimus. Sunt alia nomina *Prunorum* vulgarium, *Prunidactyla*, *Noberdiana*, et *Iuliana*.

*Psyllion*, Latine Pulicaris herba, quod eius semen pulicis simile sit, vulgus uocat, Herbes a pulces.

*Ptarmice*, Latine Sternutamentaria: à quibusdā putatur *Pyrethrum* sylvestre: alij contra omnes notas reclamare affirmant. Ea herba sic dicta est, quod eius folia trita sternutamenta moueant.

*Pulegium*, γλίνχων, Pouliot. huius herbæ cibus quotidianus in usu sanitatis olim erat, ut ex Aristophane coniungere licet. Cicero pro suauitate sermonis μεταφορικῶς hac uoce utitur. Cæterum id nomen ei inditum est, quod excitet oues ad balandum: γλινχῶν enim balare est.

*Punica malus*, ποά, Grenadier.

*Punicum malum*, ποιά, Grenade.

Quercus, δρῖς, Vng chesne. Existimatur etiam ueteribus dicta Hemeris, id est placida. Glandes autem producit, gallas item et uiscum, quod Galli Du guy appellant, Græcis autem ἰζὸς dicitur.

*Quercula χαμαίδρῖς*, petit chesne, Germandree.

*Quinquefolium*, in Officinis *Pentaphyllon*, quod non est aliud, quàm *Tormentilla* nostra. Hoc nomine censetur & planta ea, quæ septem folia habet, ut placet Ruellio, Leonicæno, & Manardo. Galenus lib. 5. *Compos. Medicament. par.* *Eupatorium* etiam quinquefolia habere scribit.

## R

*Raphanis* Dioscoridis, & *Raphanus* Galeni eandem plantam significant, quam Celsus *Radiculam* dicit, & vulgus gallicum *Raue* appellat. Nomen autem à cito apparendo habet: nam tertio à satū die apparet. Ceterū ἐξ φανος apud antiquiores Græcos pro *Brassica* etiam accipiebatur.

*Raphanis* agrestis sapore est acriore, folio latissimo, & siliquas non habet.

*Radix dulcis*, *Glycyrrhiza*, *Ragalis*: Theophrastus lib. 9. de hist. plantar. eam radicem *Scythicam* vocat, quo loco eam ἀδύλον dicit scribit, non tam quod sitim arceat, quàm quod *Scythæ* ea, & *Hippacæ* decem & aliquando duodecim diebus sine alio cibo durent. Veteres vocabant *Argalicum*, unde in quibusdam locis nomē *Gallicum* mansit, *Argalice*. Galenus lib. 7. *Medicament. part.* γλυκύαν simpliciter appellat. *Ætuaris* interdum γλυκίριον.

*Rhaponticum*, uel *Rheuponticum*, *Radix Pontica* à Celso dicitur. Galenus lib. 7. *Cōpos. Medicament. part.* vocat ῥέον ποντικόν. *Ætuaris* nunc ῥέον ποντικόν, nunc ῥέον βαρβαρικόν, nunc ῥέον ἰνδικόν appellat.

*Radicula*, *Struthion*, vulgò herba fullonum, *Saponaria*. fuit olim ita nota, ut non describatur à Dioscoride. Marcellus *Struthion* putat dici à folijs, qui-

bus imitatur passeres & minores alias aues. Vide Laniaria.

Ranunculi (Βατράχον Græci dicunt) multa illa genera nomen apud vulgus non habent, nisi quod primum genus hîc à vulgo Des bassins dicitur. Secundum genus est herba sardoa à Sallustio dicta, & in Officinis Apium risus, de quo uide Apium. Tertium ῥόδουρον, & flore aureo, nascens in sylvis, apud vulgus nomen non habet. Quartum genus flore lacteo, etiam Officinis est incognitum. Quintum hortense ob pulchritudinem in coronamenta ueniens, à quibusdam Gallis Bacilles doubles dicitur. Est & genus aliquod Batrachij globosæ rotunditatis, & gustus omnium acerrimi, quod quidam Lanceolam uocant. Vide Batrachium.

Rapum, Rabe: uide Gongylis. Græci huic radici à rotunditate nomen indiderunt: ῥόψυλον enim ῥόψυλον significat.

Rapum syluestre putatur Ruellio, quod vulgò Responses appellamus.

Rhus, ῥοῖς, alius μαρμεχός, id est, culinaris à Galeno dicitur, quod multum ad condienda opsonia ualeat. Nam eius succus etiamnum in Narbonensi Gallia uicè omphacij est. Alius appellatur βυροστέφανος, quod densandis corijs propter magnam uim adstringendi aptissimus sit. Vterque Sumach ab Arabibus dicitur.

Ricinus, ῥίον, uel ῥόπων: à vulgo Gallorum Palma Christi dicitur, in Officinis Kerua, Manus Christi, Cataputia maior: Cæterum ex eo ῥόπων dicitur, quod eius semen Ricino (quem Græci ῥόπωντα dicunt) simi-



le sit. Oleum ex semine elicitur, quod *κίονον* Græcè, Latine Ricininum dicitur: Officinæ uerò Oleum de Kerua uocant.

Rhododendron, Nerium, & (ut Plinio placet) Rhododaphne: Officinis & barbaris Oleander: uulgò Rosago, quòd florem rosæ similem habeat.

Rosmarinus, Romarin. Eius semen dicitur Cachrys.

Rubus, Rōce, *Ῥάβδος*, cuius hæ sunt species: Cynosbator, id est, Rubus caninus Palladij: sic dictus, quòd eius flores canum rabie peritorum moribus medeantur, unde nomen accepit: est autē spinis hamatis, & altus: fructum fert longum, rubrū, similem oliuæ nucleo: intus uerò lanuginosa habet semina: Sentis Latine dicitur, & Sētis canis à Columella, Esglātier sans odeur à Gallis appellatur, quòd eius rosæ sine odore sint.

Rubus humilis, Chamæbatus, interdum *Ῥάβδος* simpliciter à Galeno dictus: fert mora racematim nascentia, per maturitatem nigerrima: *Ῥάβδος* Galeno dicta, Latinis autem Vaticanæ.

Rubus Idæus, domesticus præsertim: Framboisier. Sylvestris uerò fert parua mora, melle aërio uestita, quod non colligunt mora Chamæbathi: ex his moris fit diamoron. Est & Cynosrodos, id est, Rosa canina nunc alba, nunc purpurea, & odora: Galliæ Esglantier de bon odeur appellatur. & Rosæ Damascenæ dicuntur, Rosæ de Damas. Rubus ille humillimus ferens fructus ad Rubum Idæum à quibusdam refertur.

Rumex, uide Lapathum.

Ruscus, *Ῥωσπινὸν ἀγρία*, uel (ut Theophrastus) *κρυφὸν ῥωσπινόν*, id est, sylvestris & cuspidata myrtus, quæ quibusdam dicitur Oxymyr sine: ex qua facimus scop.  
e. i.

pas illas, Houffouers vulgò dictas. Scribonius Largus vocat hanc Scopam regiam.

Ruta, πήχανον, uel (ut Theocritus) ῥύτη, Rue. Plutarchus lib. 3. Symposij sui scribit πήχανον ἀπὸ τῆς δυνάμειος ὠνομάσθαι· πήχισι γὰρ ξηρότητι διὰ θερμότητά το σπέρμα, καὶ ὅπως πολέμιόν ὄναι ταῖς κούσταις. id est, Pegnum à uiribus nominatum est. Concretum enim siccitate propter calorem semē efficit, atque omnino uterum gerentibus aduersatur.

## S

Sabina, βεγάδου, Sauiniere. Nomen Sabina à regione in qua multa est, habet.

Sambucus, uide Acte.

Sagapenum à Pharmacopolis dicitur Scrapinum. Galenus in Antidotis ὁπὲν σαγαπινὸν uocat. Frutex ferulaceus, ex quo is succus fluit, describitur à Galeno lib. 8. simplicium.

Salix, ἱτιά, du Saulx.

Salvia, ῥελίσσακος, Saulge. Nicander in Theriacis saluiam ὀνόμαζεν, id est, medicam appellat.

Sampfucus, Maiorana, Mariolaine.

Sanguinaria, uide Polygonum.

Satyrium, uide Cynosorchis.

Satureia, δύμλεα, Cunila, Latine Sarriette.

Scabiosa, non est Stœbe antiquorū: sed quidam uolunt Scabiosam esse Psorā Aëtij. Sed eos falli ex eo cōiungere licet, quòd huius fumo arborū erucæ non moriantur: quam tamen facultatem Psoræ Aëtius tribuit.

Scammonia, uide Lacrydion. Cæterū Scammonia uidetur dicta ἀπὸ τῆς σκάπτειν, id est, à fodienda et cananda radice. Nam (ut ait Dioscorides) liquor colligitur

defecto radicis capite, tum in profundo tholi modo excavata radice, ut liquor in cauum confluat, qui deinde conchulis excipitur. Cicero dicit etiam Scammonea.

Scandix, herba ea est, quæ toties Athenis in theatro plausum & risum excitavit, cum in Comædia lepidissimi poætæ, Dicæopolis ex agro in urbem profectus rudis homo, ab Euripide eam peteret, οὐκ ἔστι μοι δὲς μὲν δὲρ δὲ δὲ μὲν ος. Nouerāt enim omnes uulgare illud olus, meminerantque matrem poætæ illius quotidie in urbem uenientem, uendito eo olere, filium in summa paupertate theatro & spectaculo educasse. Nec antiquæ hominis paupertati illudebant, sed uirtutē in angustissima re admirantes exultabant. Nunc à uulgo Acicula, & Pecten Venëris dicitur.

Scilla, uulgò Scipouille, ou Charpentaire, & Oignon marin. Pharmacopolæ Squillam uocant.

Scolymos Carduus. Artichault. Paulus Aegineta tamen & Aëtius scribunt Cinaram esse carduum domesticum. Scolymon uerò agrestem.

Scordion, Latine Trixago, seu Chamædrys palustris, uulgò dicitur Chamara. Herbula est uirgulas mittens quadratas, rectas, oblongas, folia adstringentia, florem suppurpurascentem. Scordium dictum est ab odore & acrimonia Scorodi, id est Allij.

Scorodon, Allium, Aulx. Syluestre Allium dicitur οφιοσκόροδον: quanquam (ut rectè coniecisse Marcellus uidetur) legèdum est apud Dioscoridem ἀφροσκόροδον, non οφιοσκόροδον. Quod ipsum confirmant Columellæ uerba dicētis, Vlpicum, quod quidam allium punicum uocant, Græci autem ἀφροσκόροδον appellant, longè maioris est incrementi, quàm allium. Plinius conuer-



tens uerba illa Theophrasti de allio Cyprio, ποιῆν τὸν ὄγκον ἐκ πνεύματος αἰθέρος, dicit Allio Cyprio in oleo & aceto trito, spumam multum increſcere, adeò ut aphroſcorodon, à ſpuma, pro ophioſcorodo legendum ſit: cum etiam ophioſcorodi nulla ſit apud authores mentio.

ſcorodopraſum, quaſi dicas, Alliū porrinum. Nam Porrum & Alliū ſimul eſt.

Secale, ſecalis, Seigle.

Sedum, uide Acriſoon.

Seris cichoreum, uide Cichoreum & Intybus.

Serpillum, Σπινθον, Serpoulet. Nicander Σπινθον τομῶν appellat, quòd per pascua ſeſe continuè expandat. & φιλόζων, quòd ſeipſum noua continuè ſobole & propagatione radicat: Serpit enim, à quo nomen habet.

Sefamon, σίταμον, planta eſt ſimilis Milio, & habet ſemen ſimile Oryzæ. Italia olim erat fecunda Sefamo, ſed deſitum eſt ſeri, quia emaciabat agros: uel, quod uerius eſt, quia ex quo ex oliuetis olei copia habitata eſt, & homines cœperunt melle & ſaccaro ad dulciaria uti, negligi etiam cœpit. Vulgò dicitur Iugiolina.

Sefeli Maſſilienſe habet folia fœniculi, ſed craſſiora, & umbellam Anethi, Siler montanum dicitur. Allobroges uocant Sermontain: herbarij quidam uocant Saxifragiam maiorem.

Sefeli Aethiopicum eſt uulgaris noſtra Terebinthus, quæ uiſitur in hortis D. Cardinalis Bellaï.

Sitanion ſpecies tritici trimeſtris, quòd ſatum Martio menſe, tertio plerunque menſe abſoluitur. huius farina (quoniam magis emplaſtica eſt) utitur Hippocra-

tes in uulneribus. Lege illius librum de Fracturis.

Sycaminus, ἡ μουρέα, Morus arbor, Meurier: συκά-  
μων, Morum, Meure.

Sycorum Galenus ait se uidisse in Alexandria, cuius fructus similis erat paruæ ficui albæ, ita ut in medio mororum et ficuum locari posset: unde nomen inuenit, non (ut Dioscorides scribit) διὰ τὸ ἀπο-  
ρον τῆς γύσεως, id est. propter inefficacem gustum, quæ-  
si fatuam ficum. Celsus uocat hanc arborem dictioni-  
bus inuersis Morosycon.

Sideritis, herba Iudaica uulgò, et Tetraic. uidetur sic appellata, quòd uulnera ferro facta glutinet. σίδη-  
ρος enim ferrum significat.

Siligo, ὄλupa, sub tritico comprehenditur, ut ex Dio-  
scoride facile est coniungere. quod Celsus confirmat his  
uerbis, Firmius est tritici, quàm milium, id ipsum  
quàm hordeum, et ex tritico firmissima siligo. Plinius  
uocat etiam Siliginem tritici delicias: unde Paulus  
Aegineta Ἐπιμωτατον τῆς ἄρων σιγιγίτω dixit. hæc  
fruges etiamnum uidetur in Gallia Narbonensi, ubi  
Touzella appellatur.

Siliqua, arbor, καρχήρον, Carrubier: fructus autē Car-  
rubes in Gallia Narbonensi. Nomen à cornu (cuius fi-  
guram exprimit Siliqua) factum est. uide Ceratonia.

Siliquastrum, Piperitis, quæ quibusdam dicitur Pi-  
per Indicum: alijs placet esse Cardamomi genus.

Silphium, Beniouin. uide Laser.

Symphytum petræum uulgare, folio est origani, et  
capitulo thymi, sed cætera non respondent: tamen pro  
eo Bugla uti possumus. Nomen autem à glutinandis  
his, quæ discissa sunt, habet.

*Symphytum minus*, Belides, Marguerites.

*Symphytum maius* à posterioribus Latinis *Solidago* dictum est. In Officinis *Consolida maior*. In quibusdam Galliae locis *Auricula Asini* dicitur.

*Sinapi*, σινάπι, Seneue. Moustarde.

*Sion*, Lauer, uulgò *Berula*, De la berle.

*Sisymbrium* aliud dicitur *Mentha aquatica*, quæ plantata mutescit, et dicitur *Balsamita*: aliud est nostra *Cardamine*, Cresson des ruisseaux. uide *Cardamine*.

*Smilax*, *Taxus*, If: hanc abieti similem scribit *Nicander* in *Theriakis*, odore admodum uenenofo.

*Smilax aspera*, foliorum ambitu spinoso in Gallia *Narbonensi* uisitur. Nihil pro cognoscenda hac planta *Theophrasti* historia certius est.

*Smilax lævis*, *Liset* & *Liseron*, à ligandis plantis, quibus adnascitur, ut *Cissampelon* esse uerisimile sit. Quibusdam placet esse eam plantam, quæ à *Paduanis* *Liguribus* *Balsamuna* dicitur, et quæ pomum *Hierosolymitanum* *Hetruscis* dictum fert.

*Smilax hortensis*, frutex ferens phascelos et fabas pictas: fructus dicuntur à posterioribus Græcis λόβια.

*Smirnum*, *Leuesche*, dictum est ἀπὸ τῆς σμύρης, id est, à *Myrrha*, quam olet.

*Solanum*, σπύχος, De la morelle.

*Solanum Manicum*, σπύχος μακρός. uide eius descriptionem apud *Theophrastum*. Sic dicitur, quod furorem et insaniam excitet.

*Solanum somniferum*, σπύχος ὑπνωτικόν. *Pharmacopœa* et herbarij *Solatrium* dormitoriū uocant. *Noxiam* hanc herbam menti omnes tradunt, adeo, ut si



quis ultra duodecim corymbos hauserit, mētis ecstasi sentiat. De Solano halicacabo diximus suo loco.

Sonchus alter candicans est *ἡ δαδισμος*, à Venetis Lactucinus dictus: Alter uerò niger est, καὶ τραχύς. Vterq; à uulgo Gallorū Lacteron, quo cuniculi aluntur, dicitur. Apuleius Lactucam leporinam appellat.

Sorbus, ὄα uel ὄν, Cormier. Sorbum est ipse fructus, La corme.

Sparganium ostenditur, quod licet quidam Tormentillā uocent, tamen non est uulgaris Tormentilla. Dictum est autem sparganium, quod habeat foliū simile his cingulis, quibus in cunis infantes ligamus: τὰ ἀππαρα enim sunt fasciae.

Spondylium uel Spondyliū ostenditur simile Passinacae. Meminit huius herbae Nicander in generali Theriacle, quam aduersus uenenata omnia conficit. Nomen habet à uertebis, uel uerticillis fusorū, qui spondyli μετὰ πορνῶς dicuntur.

Stachis, Salvia mollis, Salvia montana, Salvia rustica uulgo dicitur: uox significat spicam. Nā ubi haec herba ad florem festinat, toto habitu est spicato.

Staphis agria nomen retinet. In Officinis quibusdā dicitur Pituitaria, quod eius semen mansum pituitam ex capite in os deducat. Illitum porro ex oleo capiti puerorum, pediculos enecat, unde Pedicularis herba à Latinis dicta est. uox significat uuam passam agrestem. Nam folia huius herbae rugosam uuam magis, quàm integros acinos exprimunt.

Stœchas, dicitur Stœchas citri à Pharmacopolis: dicta est autē à Stœchadibus insulis in mari Iberico. Multa est Stœchas praesertim Citrina in Gallia Narbonensi.

*Stratiotes nascitur in aquis, nomē significat militare.*

## T

*Tamarix, uide Myrica: fiunt ex Tamaricæ cymbia, ex quibus potant, qui ex splene laborant. In hunc quoque usum in Germania, uina Tamariscina nunc fiūt. uulgus hanc arborem infœlicem uocat, quòd nihil ferat, quanquam Plinius contra Dioscoridem & Galenum fructum ferre affirmat.*

*Thapsia nomen retinet: ab antiquis Latinis Ferulago dicebatur. Nomen id habet, quòd in Thapso insula primum inuenta sit. nascitur in Apennino, ubi Crassegnana dicitur.*

*Taxus, Smilax, If. Vide Smilax.*

*Teda, pinguior ramus Picæ: Græcè δασ, καὶ δαστον, aliquando tamen pro arboris specie accipitur.*

*Telephium, uulgò Faba inuersa, Orpinum: alijs Crassula maior dicitur, & Portulaca agrestis. uide-tur sic dictū, quòd uulneribus, quibus rex Mysiæ Telephus contemnit (quæ etiam ob eam rem Telephia ap-pellantur) uulneratus ab Achille, auxilietur.*

*Terebinthus, τέρευνθος, ea arbor est, ex qua fluit resina, quæ Terebinthina Venetæ dicitur, pro qua nostri Pharmacopœ Resina laricea utuntur.*

*Teucrium nomen retinet: & ostenditur ab herbarijs. Nomen autem accepit à Teucro Aiacis fratre in-uentore, ut Plinius auctor est, apud quem legē quo-modo planta hæc inuenta fuerit. A quibusdam dicitur Chamædrys, quòd ei plantæ similis sit: hæc herba etiam uulneraria est, uino incocta. Hieronymus Tragus herbam, Officinis & herbarijs Veronicam dictam Teucrium Dioscoridis esse credit.*

*Thalietrium*, *ῥαλνῖον*, ab herbarijs putatur ea esse, quæ super muros nascitur, vulgò *Argentaria* dicta. Itali uocant *Brisaculo*, à fædo eius odore.

*Thymelæa*, *Oliuella* quibusdā, & *Linū syluestre* dicitur. Sunt qui credant *Thymelæam* *Dioscoridis* uerum *Mezereon* *Mesuae*. Nam utrique fructus *Myrti* *baeae* æmulus est: folia etiam utrique oleæ similia.

*Thymbra*, *Satureia*, *Sarriette*. Vide *Satureia*.

*Thymū*, *θύμος*, uel *θύμον*, ut *Theophrastus*: du *Thyn*. Totam huius plantæ naturā longiore descriptione initio lib. 6. de *histor. plantar.* *Theophrastus* cōplexus est.

*Thlaspi*, *θλάσσι*, uel (ut *Galenus* scribit) *ἡ θλάσσι*: vulgò *Nasturtium tectorum*, & *Sinapi rusticorū*. Nomen habet à *θλάσσι*, quod est frangere, quòd semen *Nasturtij* simile, disci figura, & uelut *ἐπεθλασμένον*, id est infractum, habeat.

*Thryallis*, est tertia species *Phlomidis*, id est, parui *Verbasci*, quæ dicitur *Thryallis* & *Lychnis*, quòd eius folia crassa & pingua, ad lucernas sint apta. Vide *Lychnis*.

*Tilia*, du *Tillet*.

*Typha* à vulgo *Gallorum* *Massa* dicitur, à similitudine insignis illius clauæ argenteæ uel aureæ, quæ ante magistratus gestatur. Nam hæc herba in paludibus & stagnantibus aquis erumpit, folio *Cyperidi* simili, caule alto, læui, enodi, in cuius capitulo lanugo densa est, quæ in pappum tandem euanescit. Sunt qui scribendum putent *πύλω*, ut unius literæ mutatione differat à cereali *Typha*, de qua multa à *Galeno* lib. 1. de *Aliment.* scripta sunt.

*Tithymalus* à *Celso* dicitur *Lactuca marina*, à vul-



go Lactuca capraria. Galli Herbe a lai&t. Primus Tithymalus Dioscoridis est χαῖνιας, quod uallis munieris aptus sit, qui etiam Amygdalocides dicitur. Secundus Myrtites, à folijs Myrti, uel Rusci. Tertius Paralius, id est, nascens in locis maritimis. Quartus Helioscopius, quod eius coma ad solis cursum circumagatur. Quintus Cyparissias à folijs Cupressi, uel potius Picæ recēs natae. Sextus Dendroicides, id est arborefons, à ramorum copia. Septimus Platyphyllos, à foliorum latitudine, quem Galenus φλόμα ποσκότα dicit, id est, verbasco similem. Omnes herbae, quae lac purgatorium habent, sunt in genere Tithymalorum, Turbith Mesuae quibusdā uidetur secunda species Tithymali. Nicander hanc herbam θυμάνδα uocat, quam ἀγλαρία, id est, lacte abundantem, appellat.

Tragopogon, Latine Barba hirci: est autē ea planta, quae ab Italis Herba di prete dicitur. Quae uerò ostenditur pro Tragopogone, est uerius Gerontopogon. Theophrastus describit aliū Tragopogonem. Tu eum legito.

Tragoriganum Ruellius eam herbam putat esse, quae uulgò Mastic dicitur: herba est folio Sampsuci, flore paruo, odorato, è cuius umbella propendunt ueluti uilli, similes incanis hircorum uillis, unde nomen habere creditur: nam τραγός, hircus est: odore Sampsuco non aedit.

Τραγός σπῆδος, id est frumentaceus, quibusdam putatur esse Triticum barbatum. In quibusdam locis appellatur Blé turquet. Significat et confectioem ex Triticum et tritico, cuius meminit Hippocrates in lib. de ratione uictus in morbis acutis.

Τραγός νῆα, id est, Tragus herba, nascitur in muris

et petris Maio et Iunio, in Officinis quibusdam dicitur Vermicularis.

Tribulus, τεῖβος, aquaticus præsertim, vulgò vocatur Chauffe trape, apud Pictonas dicitur Macre. In Campania Saligos. Herba est nascent in stagnis et paludibus, folio ulmi, semine nucis magnitudine, duro et multum aculeato, cuius nucleus non minus, quam castanea esculentus est. Nomen à triplici cuspidè habet, ad cuius formam factæ sunt machinulæ ferreæ tetragona forma, quæ quancunque in partem incubuerint, unum aut duos aculeos semper protendunt, murices à Latinis dicuntur.

Trichomanes, species Adianti, folijs Lentis palustris, à vulgo Pharmacopolarum Politricon dicitur. Vide Adiantum. Nomen habet à multa capillorum luxuria.

Τρίφυλλον, Latine Trifolium odoratum, frutex est cubito altior, virgas tenues habens, nigris iuncisque adnascentijs præditas, in quibus folia sunt Loto arbori similia terna in singulis germinationibus, quibus recens natis Rutæ odor inest, auctis uerò Bituminis. in Officinis Trifolium simpliciter dicitur.

Trifolium pratense album, Treuffle blanc.

Trifolium pratense purpureum, Treuffle incarnat.

Trifolium pratense luteum, Treuffle iaulne.

Trifolium acutum, quod Oxycriphyllon dicitur (ut Scribonius Largus scriptum reliquit) nascitur in Sicilia. Quod uerò apud nos Oxy, siue Oxycriphyllon dicitur, Officinæ et herbarij Panem cuculi & Alleluya vocant.

Tripolium, sunt qui putant esse Turbith Serapionis. Tripolium autem ex eo dictum est, quòd eius fo-

lia (teste Dioscoride) ter die mutantur, Candida mane, Purpurea meridie, Punicea in occasu. Vide Pityusa.

Trifago, uulgò Serratula, Quercula, Quercus terra dicitur. Vide Chamædrys.

*Triticin spec* Triticum in quibusdam locis dicitur Blé, in alijs Fourment. Eius species & differētias lege apud Dioscoridem & Columellam.

Tuber, Truffle, ὄδρον Græcè dicitur, uel οἶδρον, ut loquitur Theophrastus, à uerbo οἶδαίρω, id est tumeo. Simæon Zethus scribit eorum usu frequenti Epilepsiam & Apoplexiam effici. Credidit antiquitas illi affinitatem esse cum cælo, nec nisi tonante Ioue nasci, ut Luuenalis scribit,

- & facient optata tonitrua cœnas.

Tussilago, βήχων, à Paulo Aegineta appellatur & Chamæleucæ. Vide Bechion.

## V

Valeriana, Græcè Phu, Valeriane. Quidam Latini uocauerunt Nardum syluestrem.

Veratrum, Vide Elleborus.

Verbascum, Vide Phlomis.

Verbenaca, Græcè Peristereon, quòd columbæ circa hanc lubenter uersari soleant. Veruaine. Duplex est Verbenaca, recta & supina. Recta est uulgè Veruena. Supina, ἱεροβοτάνη, id est, sacra herba, est Verbenaca communis.

Viburnum, Vide ἄμπελος ῥόδια.

Vicia, Vesse. Varro eam dictam putat à uinciendo, quòd capreolos simuliter uiti habeat.

Vicia syluestris, est ea quæ dicitur Aphacæ, Vesse sauuage, Vesseron. Vide Aphacæ.



Vetonica, uel Betonica, κέσπον, duplex: Erratica quæ Armoiries à Gallis dicitur: Altilis quæ Oeillets uocatur. Nomen habet (ut ait Plinius) à Vetonibus in Hispania populis, qui eam herbam inuenerunt, quæ in Gallia Betonica dicitur. quanquam Betonica est et herba ea, quæ nobis Betoine dicitur. Vide Betonica.

Vinca peruinca, Clematis daphnoeides, Peruèche.

Viola est propriè ea quam uulgus Giroflee appellat. Vide Leucoion.

Viscum, ἰξός, du Guy.

Vitex, Vide Agnus castus.

Vmbilicus Veneris, Græcè κοτυλιδών. Primæ speciei huius plantæ frequenti usu marem concipi, quemadmodum secundæ speciei fœminam, Hippocrates scribit. Vide Cotyledon.

Vlmus, Orme, πελέα.

Vnedo, Arbutus, arbor est et fructus, quem Cerafiū marinum coriarii in Italia appellant. Dicitur autem Vnedo, quòd unū tantum comedere liceat: magnū enim dolorem capiti infert. Vide Chamæcerasus.

Vnio antiquis Ceba erat, unde Gallicum nomen, Oignon.

Vrtica, ἀκαλήφι, Ortie.

Vrtica mortua, quæ non pungit, Plinio Lamium dicitur.

Vrticarum syluestrium acrior dicitur Cania.

Vrtica, quæ dicitur Griefche, nomen accepit à uocæ Græcæ ἀγριος. Vrtica autem Latinis ab urendo dicta est: ἀκαλήφι uerò Græcè κατ' ἀντίφρασιν appellata est, quasi μὴ ἔχουσα καλῶ ἀφλῶ, quam non sit tutum attingere: excitat enim κνισμοίς. unde à quibus-

dam κινδὶ dicta est.

## X

Xanthium, Lappa, φαλάδρωπος: herba quæ fert des Gratterons tenans aux robbes. Sic Græcis dicitur ὅτι ξανθὰς τεύχας ποιεῖ, id est, quod flavum capillum faciat. Vide Lappa.

Xiphion, Latine Gladiolus, cultellato folio herba, vulgò Spatha segetalis, L'espee de bleds. Pinus confundit aliquando Xiphion cum Cypero.

## Z

Zea tritico similis est (ut Theophrastus ait) Spelta, Peaulte: laudatur multum ab Homero qui aruum ζείδωρον passim appellat.

Zycho antiquorum respondet nostra Beria. Columella Zythi in suo carmine meminit, Aegypti inuentum, et eius usum ostendens,

Iam Siser, Assyrioque uenit quæ semine radix,  
sectaque præbetur madido sociata Lupino,  
Ut Pelusiaci proritet pocula Zythi.

## DE NOMINIBVS PISCIVM,

ex Latinis & Græcis authoribus, cum Gallica eorum appellatione: quibus in postrema hac æditione multa accesserunt.

Ἀέεμς, Breme.

Asellus maior, Græcè ὄνος: minor, ὀνίσκος dicitur, Merlus, Aigrefin. Varro hūc piscē ab asini colore sic dictū scribit. Hic piscis febris laborantibus non minus saluber est, ut Galenus ait, q̄ quilibet alius saxatilis piscis.

Anguilla, ἔχινς, Anguille. Anguillam Varro dictā putat, quod angui similis sit.

Acus, ἡ βελόνη, uel ἡ ἐξ πικ, Aiguille: collum habet gruis uel ciconiæ similitudine, colorē uerò argenteum.

Aurata, uel Orata, ὁ χρυσοῦς: in Aquitania, Daurade. Sic autem dicta est, quod (ut ait Ouidius in Halieuticis) auri decus imitetur. Nam & Græcum nomen supercilia aurea significat. Inter Auratas uēditur nūc Zaphirus piscis, à colore cyaneo dictus, sapidissimus, qui fortasse fuit Scarus antiquorum.

Alosa, uel Alausa, Alofe: hoc nomine Γαζα πλωῖσται piscem apud Aristotelem exprimit: Latini Clupeam uocant, quod nomē Veneti retinuerūt, Chieppa enim ab eis dicitur. Hic piscis in Aquitania tam frequēs est, ut rectè plebis opsonium Ausonius dixerit. In ea autē regione præsertim maior, Coulac uulgò dicitur: Pisces autē quos hīc puellas des Pucelles, & in Aquitania Gathes uulgus uocat, de alosarum genere sunt. uiri docti etiam eos pisces qui uulgò Harens & Sardes dicuntur, putant ad hoc genus referendos.

Alburnus uidetur piscis, quem uulgò Able dicimus,



qui, ut Ausonius ait, præda est puerilibus hamis: uel potius is piscis est, qui etiamnum apud Santonas, Aubourne nomine à Latino factò, dicitur.

Αμια Romæ & Neapoli Lampuga dicitur. Piscis est scombri magnitudine, rictu magno & luteo, dente uno in inferioris gingivæ mucrone, qui superius labrū & nares perforet, cæteris dentibus introrsus hamatis, & ingrediēti escæ cēdētibus, exeunti renitentibus: colore albo est, lividis maculis ueluti argenteis guttis distinctus. ἔυχολον autē, id est, boni succi, Hicæsius apud Athenæū scribit. Αμιαὶ autem dicuntur ὅτι οὐ κατὰ μίαν φέρονται, ἀλλ' ἀγελιδόν. id est, quòd non solæ, sed gregatim uiuant.

Αρνα, ἀφύν, Anchois. Sic dictus est pisciculus hic quòd ex pluuia nascatur. Latine etiam lupus, quòd immani rictu pro portione reliqui corporis sit præditus. Græcis etiam ἐγκρασίχολος dicitur, quòd caput bilioso quodam humore & amaro imbutum habeat. Itaque dum ex ea salsamentum fit, caput ei adimitur, ob id mutilis appellatur. Ex eo fit muria. lege Plinium libro 31. cap. 8.

## B

Βαλενα, ἡ φάλαγα, Balene: fistulam in fronte habet.

## C

Cyprinus, κῳπρινος, uel (ut est apud Athenæum) κῳπριανος, Carpe. Dorion autem apud eum authorē, λεπίδων, id est squamosum, appellat.

Congrus, uel Conger, γόγρος, Congre. Galenus hūc piscē duræ carnis esse scribit, & quæ uix confici possit.

Cuculus, κόκκυξ, Cocu: à Massiliensibus Gallina dicitur: à Neapolitanis, Cœchus: à Siculis, Cochus. Pifas

is irretitus uocem Cuculi auis similē edit. Vnde nomen inuenit. Numenius apud Athenæum hunc *ῥυθρον* appellat, id est, rubrum: quæ appellatio conuenit pisci, qui pro cuculo ostenditur.

Crocodilus, ὁ κροκόδελος, Crocodile. κροκόδελος autem dicitur *ῥῥα* τὸ δελὸς, καὶ τὸ κρόκος: nam Crocodilus, præsertim terrestris, crocum refugit. Ob id mellis confectores dū timent alueis à Crocodilis, crocum illinunt. uel *ῥῥα* τὸ δελαίνεσθαι τοὺς κροκάλους, id est, à timendis litoribus maris. Nam marinus Crocodilus in litore maximè meticulosus est.

Citharus Massiliæ appellatur Truye, à grūnitu: unde apud Græcos nomen habet, quod citharæ sonū referat. Hispanis Gallus dicitur, Romæ Pesce di sancto Petro: cui uidelicet Gallus cantauit. Piscis hic setis hirtus est in dorso. Cæterū, q̄ is piscis Rhombo similis dicatur, id ad carnē potius, quàm ad formam referendum est.

Capito, ὁ κίφαλος, piscis è Mugilū genere, Testart. Romæ Cephalo dicitur. Galenus optimū esse scribit, qui in purissimo mari uersatur. Plura de hoc pisce Hicæsius apud Athenæum lib. 9. Dipnosophist.

Cancer, ὁ καρκίνος, Plinio est commune nomen, quo ὀστρακοδέρμα comprehenduntur. Aristoteles tamen eos cancros tantūm uocat, quibus corpus est rotundū. Cancer est etiā species ὀστρακοδέρμου. Galli uocant des Crabes. Galenus scribit Astacos, Paguros, Cancros, Locustas, Caridas & Gammaros dura carne constare, atque ob id difficillimè confici, sed firmi alimentum esse.

Cete, τὰ κῆτη, apud Aristotelem sunt omnes pisces maximi, uiuipari. Paulus Aegineta tamen Thunnium ouiparum inter cete numerat.

Cochlea terrestris, ὁ κοχλίας, Limasson, Escargot. Cochlea aquatilis alio nomine dicitur Turbo, ὁ σπόμ-  
 Coς, Limas de mer. Dicitur autem Turbo, quòd ex  
 amplo in tenue desinat, in uertiginem tortus. Hesiodus  
 κοχλίας φερέοικεν, id est, Domiportā uocat. Plinius scri-  
 bit Hirpinum instituisse uiuaria cochlearū, cochleās-  
 que altiles ad eam magnitudinem per ductas, ut singu-  
 larium calyces octoginta quadrantes caperent. Carne,  
 ut Galenus ait, dura sunt, & ob id concoctu difficili.

Colias, Maquereau, Maculis liuidis, obliquis in lon-  
 gum in tergo. Scombrus duplo minor, maculis flexuo-  
 sis, transuersis toto dorso.

## D

Delphinus, uel Delphin, ὁ δελφίς, Daulphin: numera-  
 tur inter cete, ut qui animal. pariat. hūc piscē maxime  
 φιλαίῳ πωπν esse Aristoteles & Aelianus scribūt: Simo-  
 nīsq; appellatione ita gaudere, ut hoc tāq; illicio ductus,  
 appellātes sequatur, a piscatorib⁹ fide dignis auditū est.

Digiti, οἱ δάκτυλοι, ex genere testa obductorum, ab  
 Adriatici sinus incolis Cappæ longæ dicuntur. Ex eo  
 autem Digiti appellantur, quòd speciem humani digiti  
 gerant. Ungues etiam dicuntur, quòd eorū testa ungui-  
 bus sit similis. Appuli hos pisces Imbrices appellāt, quòd  
 eorum testæ imbricibus similes sint. Appellantur alio  
 nomine à Galeno & Athenæo σπλιῶες, αὐτοὶ, & δόνα-  
 κες. lege Athenæum libro 2. Dipnosophist. Galenus scri-  
 bit dura carne esse, & ob id δειπνήτους.

Draco, ὁ δράκων, à multis creditur is piscis, qui Viua  
 uulgò dicitur: hūc Galenus, Philotimi sententiā probās,  
 inter eos qui sunt duræ carnis reponit. Sed reuera piscis  
 nostra Viua multò maior uidetur apud Sātonas in li-



torre Oceani Aquitanici, Draconi haud longè dissimilis.

## E

Echinus, ὁ ἐχῖνος, orbiculatus, ex genere testa obducto  
rū: undiq; aculeis armatur, quibus pro pedibus ad in-  
grediendū utitur. Ericius autē à Massiliēsis dicitur.

Gobio, Gobius, Cobio, ὁ γοβίος, Gouion, Loches, con-  
coctu facilis, & optimi succi est. Hicēsius tamen apud  
Athenæum ὀλίγοις καὶ κακὰ χύμους esse scribit: quod,  
meo quidem iudicio, intelligendum est de his, qui in  
ostijs fluminū uersantur. Vide huius piscis descrip-  
tionem apud Ausonium in Mosella.

Gāmarus, ἀσκαὸς, Escreuiffe de mer. Omar Mas-  
siliæ adhuc Græcum nomē retinet. Locustæ forma est,  
quæ ἀσκαὸς Græcè dicitur.

Gladius, ὁ ξιφίας, à Massiliensibus piscis Imperator  
dicitur, q̃ rostro sit mucronato (ut Plinius lib. 32. cap. 2.  
scribit) & gladiū similiter Imperatori gerere uideatur.

Hippocampus pisciculus à Liguribus & Massiliēsi-  
bus Caballus marinus dicitur. Capite est oblongo, &  
collo equino, rostroque oblongo, à cuius frōte tanquam  
iuba quædā propēdet. flexu caudæ etiā equum refert.

Hirūdo, χελιδὼν, Harondelle, à piscatoribus Mas-  
siliæ Lendola dicitur. Visus est hic piscis à uiris fide  
dignis quatuor cubitis extra summam aquam ad la-  
pidis iactum uolare.

## I

Icthyocola piscis, cuius coriū glutinosum est, quod  
ipsa nominis ratio ostendit Morue.

Iecorarius, ἰκταριος, rarissimus piscis, Abramidis spe-  
ciem referens. Hunc Galenus inter molli carne pisces,  
& Ἀπτεροὺς reponit.

## L

Lampetra eadem est cum Mustela, quæ Græcè λαμπρὴ dicitur. Est autem piscis longus, tenuis, & lubricus, sine pinnis, murenæ similis, colore nigricans, branchijs detectis instar foraminum; quæ septem utrinque habet, Lamproye. Docti viri λαμπροψαρον, & quæ ab Oppiano ἰχθυὶς dicitur, huc referunt.

Λάπρς, la Megre, habet in capite duos lapides. De hoc pisce lege multa apud Athenæum lib. 7.

Loligo, ἰπυρὶς, similis est Sepiæ, nisi quòd aliquāto longior est, quàm Sepia, & ꝑ illa rubrū, hæc nigrū in timore liquorem fundat. Dicitur hodie Calamariū, & à Massiliensibus Græcam uocem retinentibus Tautte appellatur. Calamariū autē dicitur, uel quòd scriptorij calami similitudinē gerat, uel quòd atramentum habeat. Hic piscis, etsi tangenti mollis est, carne tamen (ut Galenus ait) dura est, & ad conficiendum difficili.

Lucius, Ausonio dictus Glanis uel Glanius, ab incolis Ligeris & Sequanæ, Brochet dicitur. Piscis est omnium medicorum iudicio ἀπὸ πρῶτος, & optimi succi.

Lupus, ὁ λαβροῦς, vng Loup, vng Varol Italis. Spigola Romæ. Franc. vng Bar. Huius piscis descriptionem lege apud Plinium, Ausonium, Iouium, & Massariū. λαβροῦς autem ἀπὸ τῆς λαβρότητος, id est, ab impetu & uoracitate dicitur. Nam aliorum piscium maxima uorago est. Aristophanes apud Athenæum hunc piscem σφαῖταρον appellat, quòd (ut ego quidem arbitror) mira arte ex hamo elabatur.

Lutra, uel Lutris, ἐνυδρίς, vne Loutre.

## M

Mugil, Mulet. Multa sunt eorum genera.

Mytuli, μύτις, Moules. Celsus vocat Musculos, quorum iure aliis citari commodè potest. Diphilus apud Athenæum paruos Mytulos omnium optimos, & saluberrimos esse scribit.

Mulus, Rouget barbu, Barbehault Burdigalæ, ἡ τεῖγλα: à colore muleorum calceorū apud Latinos dictus est, quibus purpurei coloris primò reges Albani, post Patricij usi sunt. Docti quidam homines ad mulum etiā referunt, quē vulgò Rouget dicimus, uel potius Surmeuillet. Nobilitatus est autem hic piscis à Cicerone, qui eum Barbatulum uocauit. Gemina enim barba inferius eius labrum ornatur. Dicitur autem hic piscis etiamnum in Græcia Trigla. Ligures & Massilienses corruptè Trigam uocant. Qui Nicæam incolunt, Strilham. Caro huius piscis durissima est, & maxime friabilis, nutritque copiosissimè, quum bene concocta fuerit. Celsus tamen inter duros & teneros pisces medium facit. Cæterum Trigla dicuntur, quòd (ut ait Oppianus) τεῖγλον οἰσιν ἐπὶ τὸν ὄγιν εἰσι γονεῖσι. Id est (Lippio interprete) Accipiunt Trigla trino cognomina partu. Nam, ut ait Aristoteles lib. 5. de historia animalium, ter anno pariunt. Alij ex eo Triglas dictas credunt, quòd triformi Dianæ dicatæ sint.

Mæna, αἱ μαρίδες: Mendole Massiliæ, Meurtæ Venetis, Massario putantur haleculæ: qualis fortasse est noster Celerinus.

Muræna, μύραινα, uel Dorico more, σκούρανα, Muræne: alia colore subnigro, luteis maculis distincto est: alia albo, nigris maculis uario, oris rictu, nō aliter quàm anseres, largissimo: foraminibúsq; his caret, quibus Læpetra prædita est: nulláque habet neque branchias,  
f.iiij.



neque pinnas. Integra flexuoso corporis impulsu natat: in arido etiā similiter atque serpētes serpit. Carni- uora est, dentibūsq̃ue malefica. Proinde Veditius Pollio eques Romanus nouæ huius sæuitiæ perscrutator, ser- uos ad mortē damnatos, non ad feras, sed in murenarū uinaria proijciebat. Optimæ ex hoc genere sunt, quæ Flutæ, à Græcis πλωται, quasi nauigabiles dicuntur, quòd in summa aqua fluitātes mergi nō possint. Piscis hic in uinarijs Romæ altilis fuit. Crassus enim altilē murenā adamauit. Antonia Drusi etiam sic in deli- cijs murenā habuit, ut gemmatas in aures ei addiderit.

Murena fluuiatilis omnino nostræ Læpetræ simi- lis est: & à quibusdam Galeos dicitur. Athenæus An- dreæ cuiusdam autoritate affirmat falsum esse Mu- renas cum uiperis coire. Murenarum porro carnes non minus nutriūt, quàm anguillarum & congrorum, ut Hicæsius affirmat: uerūm propter duritiā quandam innatam, & humorem tenacem difficillimè concoquun- tur. Earum lactes multum commendantur, quibus He- liogabalus (ut Lampridius refert) omnem aulam & rusticos aliquando paviit.

## N

Natex, ἡ νηκτῆρ, Nacre. Natrix Theodoro, cochlea marina, magnitudine exigua, turbinati generis, læui te- sta, ampla & rotunda: ab incolis sinus Adriatici etiam nunc Nerite dicitur. Hispani uocant Caragolum, pe- tit Limasson de mer.

## O

Orata, Vide Aurata.

Ostrea, ostreæ, uel Ostreum, τὰ ὄστρεα, Ouitres, concharum generis nobilissima, testam scabram habent,

inter lautissimos cibos recepta. Ea, quum Romana res magnitudinis & luxuriæ fastigium teneret, Brundisio in Lucrinum lacum transferebantur, ubi mirificè pinguescebant. Vnde Martialis,

Ostrea tu sumis stagno saturata Lucrino.

Fueruntque adeò in honore ipsis gulæ proceribus, ut in remotissimas à mari regiones lignis lacubus apportarentur. Galenus Ostrea inter alia testacea carnē habere molliissimā scribit, aliumque ualentius subducere, & corpus imbecillius nutrire. Plura de his Mnesitheus apud Athenæū libro tertio Dipnosophistarum.

## P

Paguri, πᾶγυροι, ex cancrorū genere, dorso aliquanto læuiore, quàm cæteri cancri, forcipibus ita magnis sunt, ut quicquid corripuerint, uehemēter constringāt. hi dū coquuntur, partim rufescunt, partim nigrescunt. Veneti eos Poros uocant, Massilienses Carabafos.

Passer, ἰσθία, Græcis nomen est cōmune, quo comprehendunt omnes hos pisces, qui uulgò Soles, Poles, Plies, Quarlets, Limandes, Flez, Barbues, Turbots dicuntur. Rhombus autem (quē Gallico nomine Turbot appellamus) & passer solo corporis situ differunt. Si enim Rhombum sic in latus componas, ut oculi cælum suspiciant, & mentum deorsum uersus spectet, pars supina erit dextra: sed si similiter Passerem constituas, supina pars erit læua. Rhombus igitur est Passeri similis, sed amplior. Passer uerò doctis quibusdam hominibus nostra Pleza est. Nam hic piscis supina parte candidus, & pronus nigricans, similiter passeri aui est. Alijs putatur esse Barbua nostra, quam Rhombi fœminam quidam coqui appellant. Piscis hic mollē car-

f.iiij.

nem habet, & quæ confici facîle potest.

*Pastinaca*, ἡ πρεζων, *Planus* & *cartilagineus* piscis. à *Liguribus* *Ferrasa*, à *Massiliensibus* & *Monspessulanis* *Glorieuse*, *Crapault de mer*, à *Siculis* *Bastonnaca* dicitur. Gerit hic piscis in cauda aliquid, quo nihil pestilētius mare generat. Carnem habet mollem ac iucundam, nec concoctu difficilem.

*Pectines*, οἱ κτέρες, *Coquilles de Saint Jacques*, binis auribus sunt ex genere testaceorum, quæ sanguine carent, noménque ex eo habent, quòd striati, pectinati & rugis quibusdā diuisi sint. Quòd autem ab *Aristotele* pisces hi volare dicuntur, id ita accipiendo scribit *Massarius*, ut intelligas eos uelociter se mouere, & ueluti se eiaculari. Eorū ius, ut omnium ferè concharū, ad mouendam alium cōfert. Tu plura de hac re apud *Athenæum* lib. 3. *Dipnosophist.* lege.

*Pectunculi*, *Pectuncles*, altera aurium mutili.

*Pelamides*, αἱ πελαμίδες, parui *Thunni*. Des petis thuns. Nam à sexto mēse ad annum *Thunni* *Pelamides* dicuntur. Dictæ autem sunt *Pelamides*, quòd in luto uersentur. Pisces hos non esse tam dura carne, quàm maiores *Thunnos* *Galenus* ait: & si sale condiantur, laudatissimis non cedere. Quod ipsum scribit *Athenæus* libro octauo *Dipnosophist.*

*Perca*, ἡ πέρκα, *Perche*. Alia marina est, alia fluuialis. Marinam tertio loco inter saxatiles *Galenus* reponit, *Chana*, *Perca*, *Phycis*, seu *fuca* similes sunt.

*Phoca*, φώκη, *Vitulus marinus*, *Beuf de mer*, ex genere cetaceorum, ob id carnem duram habet, & excrementitiam.

*Polypus*, ὁ πολύπους, *Poupre*, à multitudine pedum



nomen inuenit: ex mollium genere est, pedibus octonis constans, per quos acetabula quaedam dispersa habet, quibus quod apprehenderit, ita retinet, ut diuelli nequeat, adeò ut hominem in terram deiciat. Describitur hic piscis diligentissime ab Aristotele libro quarto de Historia animalium, qui locus citatur ab Athenæo libro 7. Dipnosophist. ubi de Polypi natura multa scribit. Cæterum etsi ex mollibus est piscibus, tamen (ut Galenus ait) durā carnem habet, & concoctu difficilem.

## R

Raia mas, ὁ βάτος, uel ἡ βάτις, vne Raye. Dicitur autem βάτος, quod caudam spinis horrentem habeat. βάτος enim sentem significat. Inuenitur tamen huius generis piscis cute læui, quem Græci λειόβατον dicunt: & alius maculis distinctus, & ob id βάτις ἀσπείας dicitur. Piscis hic, ut cartilaginea omnia, carnem mollem & concoctu facilem habet.

Rhombus, vng Turbot, nomine Passeris ab Aristotele comprehenditur: Rhombus autem vox Græca est, significans propriè figuram quadratam, solidam, cuius latera sunt æqualia, anguli uerò omnes obliqui. ad quam figuram piscis hic effectus est. Cæterum mulieres ueneficas ad lunam deducendam Rhombo usas esse ex Martiale conijcere licet,

Quæ nunc Thessalico Lunam deducere Rhombo, &c.

## S

Salar Ausonij sine dubitatione est vulgaris nostra Trutta. Prima ætate autem Salar purpureis guttis distinguitur, leuine truitte: Media maculis atris, grande Truitte, deinde Salmo.

Salmo, Saulmon, piscis fluminalis, squamosus, car-

ne interius rubra.

Salpa, ἡ σάλπη, Salpe, Vergadelle apud Montem Pessulanum. Piscis est obsœnus sectans stercora, de cuius natura, lege librum quantum de historia animalium Aristotelis, & Athenæum lib. 7. Dipnosophistarum.

Sardas, & Sardinas ex hoc dictas Galenus putat, quod ex Sardinia importentur. Theodorus his uocibus Græca nomina, τεχίδας & τεχίας, apud Aristotelem exprimit. τεχίδες autem appellantur à minutis ossiculis, pilorum subtilitatem æmulantibus. Nos uulgò Sardines, Anchois, & Sardes appellamus.

Scombrus, ὁ σκόμβρος, ex genere lacertorum, à Liguribus & Neapolitanis dicitur Lacertus, à Massiliensibus Auriolus. Hicæsius apud Athenæum piscem hunc ἄχολον, id est, boni succi, plurimumque alere scribit. Vide Colias.

Sepia, ἡ σπία, Seche. De huius piscis natura multam iam dicta sunt in dictione Loligo.

Solea, βεγλωσσον, Lingulaca à Varrone, Sole: piscis planus similis Passeri, carnem mollem & confectu facillimam habet.

Sturio, uox est à uulgo excogitata ad significandum magnum illum piscem, quem Galli Esturgionem, omnium lautissimum uocant. Atilus Latine dicitur. ab Aristotele φωκῆνα, à Plinio Turzio: quidam exossem, alij entacum & Oxyrhinchon esse putant. Piscis hic Burdigalæ frequentissimus est, ubi Creac dicitur, quod (ut ego quidē arbitror) eius caro quadrupedis carnem uerius referat, quàm piscis. P. uul. Iomus putat esse antiquorum Silurum, cui reclamatione Massarius. Tu eorum commentarios lege.

## T

Testudo, ἡ χελών, Tortue, ex eorum genere, quæ ἰσπραχόδεμα dicuntur, et oua pariunt.

Testudo aquatilis, Mus marinus à Plinio dicitur.

Testudo terrestris, Mus terrestris dicitur. Aristoteles testudines in aqua uersantes appellat ὠμύδας. Marinae testudines in mari Indico, seu Taprobana insula ad tantam magnitudinem perueniunt, ut singulorum testa habitabiles casae tegantur.

Thūnus, ὁ θύνος, la Thunnine. Caro huius piscis ut cetaceorum omnium, dura est, et multum excrementi habens, nisi sale condidatur, quæ tunc est nostra uulgaris Thunnina: optima quidem, si (ut scribit Aristoteles) ex annofo Thunno fiat. Dicitur autem Thunnius τὸ τὴν θύναν, id est, ὀρμαίν, hoc est, moueri multo impetu. Nam hic piscis et Gladius agitantur æstro Canis exortu. habet enim uterque piscis per id tempus sub pinna tanquam uermiculum, quem asilum uocant, effigie scorpionis, magnitudine aranei: unde fit, ut eo permotus Thunnius in nauigia exiliat.

Tinca, Merulae marinae simillima, Tanche: hunc piscem uulgi solatium uocat Ausonius in Mosella, quod pauperioribus tantum apponatur.

Torpedo, ἡ ράπην, uulgo Gramphus ab effectu dicitur, quod efficiat Guttam grampham, La goutte grampe. Nam leuem quendam torporem tangenti inducit. Dicitur etiam Torpin: Massilienses Miraillet à maculis, Ligures Tremorizam uocant. Piscis hic ex genere cartilagineorum est, carneque mollem, iucundam (ut Galenus ait) et coctu haud difficilem habet. Athenæus tamē libro septimo Dipnosophistarum huius



piscis caput tantum, & huic propinquas partes confectu faciles esse scribit. Comeditur Venetijs & Ianuæ.

Trigla, uide Mulus.

Tructa, uel Trotta, Truitte. Vide Amia & Salar.

## V

Vertebra, ὁ σπονδυλος, uel σπόινδυλος, Columellæ inter conchas est. Constat autem duabus conchis, atque ex posteriori parte uertebri quibusdā continetur, unde nomen inuenit.

Vmbra, ἡ σκία, uulgo Vmbrina, frequens est piscis in Ligeri. Dicta est Vmbra à colore. Dicitur & ab Epicharmo apud Athenæum, σκιάρις.

Vnguis, Vide Digitus.

Vrtica, ἡ ἀκαλῆφι, à Plinio numeratur inter ζωόφυτα, id est, quæ nec animalium, nec fruticum, sed ex utroque temperatam naturam habent. Totus carneus is piscis est, nullaque testa clauditur. Tactus eius, ut terrenæ urticæ dolorem immittit. Ligures & Massilienses adhuc Vrticam uocant.

## NOMINA AVIVM GRÆCA

Ἑ Latina, cum Gallica eorum appellatione.

*Acanthis* uertitur à Γαζα apud Aristotelē spinus Ἑ *Ligurinus*. Quidā putant eam esse αυε, quæ Char-donneretus dicitur. Dicitur autem *Acanthis*, ἀπὸ τῆς ἀκανθῶν, id est, à spinis, in quibus pascitur.

*Accipiter*, ὁ ἰεραξ, Sacer ales à Virgilio Græcæ uocis uim exprimente dicitur, quo loco, Sacer pro magno, meo quidem iudicio, accipiendum est: nam *Accipiter* aquilam magnitudine æquat.

*Acredula*, ὁ λολυών, auis canora, à quibusdā uulgo dictus *Rauatinus* esse creditur, alijs noster *Tarinus*, alijs *Luscinia*. Ex earum genere est, ex quibus futura tempestas prædici potest, ut scribit *Aratus*, ἢ τελεῖει ὁρ-δρινὸν σημαίν ὁ λολυών. Quem uersum sic interpreta-tur *Cicero* lib. 1. de *Divinatione*,

Et matutinis *Acredula* uocibus instat. Describitur hæc auis ab *Arati* interprete. tu eum legito.

*Ægithus*, ὁ αἰγίθος, auis est minima, dissidens cum asino: hic enim se spinis affricans, nidos eius dissipat: quod adeò pauet, ut uoce omnino rudentis audita, o-na deſciat. Vide *Aristotelem* lib. 9. de *Histor. animal.* Ἑ *Plinium* lib. 10. cap. 75.

*Alauda*, Latine *Cassita*, ἢ κέρεις, κόρυδος, Ἑ κερυδα-λὸς, *Alouette*. Quæ habet cristā, ἀειφρασικῶς, ἢ κέρεις τὸν λόφον ἔχουσα dicitur, quam Latini uno nomine *Galeritam*, *Varro* *Galericulū* appellat. Galliæ, *Cocheuis*.

*Anas*, ἢ νῆπια, vne Cane, ou Canard. *Alexāder* *Myn-dius* apud *Athenāū* dicit marem maiore esse, Ἑ magis uersicolorē, Ἑ id quod cæsiū est in oculis, paulo minus

habere, quàm fœminam. Caro huius avis dura est.

Anser, ὁ χῶ, vne Oye. Avis nota, cuius caro difficillimè cōcoquitur, alæ tamē ad coquendū facales credūtur. Athenæus scribit Anserū præsertim οἰτυτῶν, id est (ut uertit Plinius) fartiliū, hepata apud antiquos πλατεῶν, et Romæ olim πελαποῦδα, id est, magno studio parari solita. De qua re lege Plinium lib. 10. cap. 12.

Apes, apedis, ἀπὸς, quibusdam putatur esse avis, quam uulgò Martinetum uocant. Caret pedibus, ex quo nomen habet: hirundini usque adeo similis est, ut uix discerni possit.

Apia ster, ὁ μέροϛ. Auicula est apibus nocens, ut scribit Aristoteles lib. 9. de Histor. animal. Mesange uulgò dicitur. Hæc avis simulatque uolare didicit, parentes (ut Aelianus scribit) alit, pietatēque omnibus avibus ob id præstat.

Aquila, ἀετὸς, Aigle. Animal est uolentū, neq; modò in assequēdis ad uictū necessarijs rapinas facit, sed etiā usu carniū delectatur. Nā ad se explendū lepores, hinnulos, anseres ex cohorte, et alia pleraq; rapit. Ex avibus maximè acres oculos habet, adeo ut si felle eius ex melle Attico illinantur hebetes oculi, acutiores fiant. De eius natura lege Aelianum lib. 14. de histor. animal. De aquilarum generibus lege Plinium lib. 10. cap. 3.

Ardea, Ardeola, ὁ σῶδιος. Heron. Hanc auem pullis uolandi imperitis duam se præstare ferunt.

Attagē, uel Attagna, ὁ ἀτῆαχῶ, uel ἀτῆαχῆς apud Aristophanē. Depingitur ab Alexandro Myndio apud Athenæū lib. 9. Dipnosoph. Est (inquit) perdix paulo maior, cuius dorsum uersicoloribus maculis distinctum est, testēq; figulinæ coloris speciem gerit, nisi q̃ magis rufum



est. Graui est corpore, & breuibus alis, ut à canibus facile capiatur. puluatione gaudet, & sicut gallinaei, grano utitur. Caro huius auis ad coquendum facilis est. Laurētius Valla in Raudensem ab Italys vulgò Francolinum uocari scribit. Aristophanis interpret seruos, quibus frequētia stigmata faciē deformarēt, à poētis dorsihuius auis similitudine, attagus dictos fuisse scribit.

## B

Bubo, ὁ βῦας, Hibou. Auis similis noctuæ, sed non minor Aquila, ut Aristoteles refert.

Buteo, ὁ τεύρως, Auis ex accipitrū genere. Buzart. Sic autem Græcè dicitur à testiculorum numero.

## C

Caprimulgus, αἰγροδύλας, auis montana, paulo maior quàm merula, minor uerò quàm cuculus, in caprarū stabula aduolans, earū ubera sugit, qua iniuria uber extinguitur, & capræ cæcitas oboritur. Grand merle qui tette les chieures.

Carduelis, uel Carduelus, ἡ Σπάρπις, Chardonneret. Aristoteles lib. 8. de Histor. animal. refert ex his esse, quæ spinam appetunt: in quibus etiā spinus siue Ligurinus est, quem Græci ἀκαστίδα uocant: unde factū arbitror, ut omnes eas aues Chardōnerettos Gallico sermone appellemus, quæ spinas & carduos appetant, et si inter se differunt.

Cassita, Alouette. Extat elegans apologus de Cassita apud Gellium lib. 2.

Ciconia, ὁ πῆλαργος: parentes ætate exacta, magna cura alit, unde ἀντιπαραρχῆν, uerbum factum est: & παραρχῆς νόμος, lex ab Aristophane dicitur, qua liberi parentes alere iubentur. πῆλαργος autem dicitur διὰ τὸ

ἔχιν πτερόνιδον, ἢ ἰσχυρὸν, ἢ ἰσχυρὸν: πτερόν enim nigrum, ἔχιν  
 ἰσχυρὸν, album significat.

Cinclus, ὁ κύκλος, putatur à quibusdam, quæ vulgò  
 dicitur Battemare. Ex his ambus est, quæ semper cau-  
 dam mouent, ἔχιν ob id à quibusdam σισσοπυρίδα vocari  
 suidas scribit: quod uerbū exprimere uolentes Latini  
 quidam, Motacillam audacter uocauerūt. Avis est in-  
 firma, ἔχιν quæ per se nidum construere non potest, un-  
 de pauperes, rusticorum prouerbio, Cincli uocantur.

Circus, ὁ κύριος, tertia species accipitris, quam vul-  
 gò appellamus, Quercerelle.

Columbus, uel Colūba, αἰετὸς, uel αἰετὸς, nomē  
 est, quo species omnes αἰετῶν ab Aristotele lib. 5.  
 de Hist. animal. descriptas cōplectimur: quanq̃ ἔχιν αἰε-  
 τὸς, species est minor Palūbo, ἔχιν maior Vinagine, de  
 quibus suo loco dicitur. Aelianus scribit Columbū ex-  
 clusis pullis terrā salsuginosam in os eis indere, ut ea  
 gustata, deinde facillimē reliquis cibis uesci queāt. huius  
 auis caro (ut scribit Galenus) ad coquendum facilis est.  
 Cæterū quòd uulgus putat hanc auem felle carere, id  
 falsum est: nam intestino in ea aue fel iunctum est.

Cornix, ἡ κορώνη, Corneille. Hæc auis (ut refert Ari-  
 stoteles lib. 5. de histor. animal.) castissima, ἔχιν coniuga-  
 lis amoris seruantissima, ad uitæ extremū uidua per-  
 manet, unde in nuptiis olim ueteres, post Hymenæum  
 cornicem inuocabant, hocque concordie symbolum his  
 dabant, qui liberorum gratia conuenissent.

Coturnix, ἡ ὀρνις, Caille. Phanodemus apud Athe-  
 næū dicit Delū ab Achæis idcirco Ortygiā nuncupatā,  
 quòd eiusmodi uolucres ex mari proficiscuntur in eā in-  
 sulam portuosam. Dicta est autem Coturnix (ut Festus

ait) à uoce, à qua multis auibus nomina indita sunt.

Coruus, ὁ κόρυξ, Corbeau. De huius auis intelligentia lege mira apud Plinium lib. 10. cap. 43.

Cuculus, ὁ κόκκυξ, Cocou. Sapiens est auis, cui (ut Aelianus ait) cum excludendi pullos facultas non sit, propter frigidam corporis temperationem, in alaudæ & luteolæ nido parit, quod non ignoret ab his oua suis persimilia pari solere. Si autem earū auum nidos uacuos reperit, in alios diuertit, ubi oua sunt, hisque sua immiscet: quæ si plura fuerint, ex his quædā perdit, ac in eorum locum sua supponit, quæ non ab illarū ouis ob similitudinem internosci possint, atque ea postea ab alauda uel luteola excluduntur.

Curua, ἡ ἐπιδίς, uel ὑποδίς, auis est, quæ Cuculi oua fouet & excludit: à quibusdam in Gallia dicitur Verdon.

Cypsellus, ὁ κόψαλλος, auis est hirundini similis, eadem cum Apode: quam auem uulgò Martinetum appellari diximus.

## F

Ficedula, ἡ συκαλὶς, auis cui nomen à fici, qua, ut Varro ait, hæc auis saginatur & pinguescit: uel quod ficium tempore (ut Alexander Myndius apud Athenæū refert) capiatur. appellatur uulgò Becquefigue. De huius auis natura lege plura apud Aristotelem libro 9. de Histor. animalium, quo loco eam aliquando ἀγὰ γόρυπον, id est, atricapillam fieri ait.

Frigilla, ἡ ἀνίττα, hæc auis apud Latinos (ut Festus ait) ex eo dicta est, quod frigore cantet, & uigeat: uulgò dicitur Berce.

Fulica, uel Fulix, ὁ κέπος, uulgò Foulque. A quibus.  
g. i.



busdam etiam dicitur Diabolus, quod furua sit. uiuere  
in mari, uel stagnis: ob id uulgò Poulle d'eaue dicitur:  
ex ea uenti prognosticon Aratus sumit, cuius inter-  
pres multa de ea scribit.

## G

Galerita, Vide Alauda.

Gallina, ἡλεκτειός, vne Poulle, ou Geline. Thomas  
Magister annotat uocē ἡλεκτεῦων significare marē et  
foemina, ἡλεκτειός autē esse uocē planè poëtica, ἡλεκτωρ  
uerò uocabulū esse ἀδοκίμων: uerūm is fallitur: nam Ari-  
stoteles lib. 6. de Hist. animal. uocē ἡλεκτειός, et Aristoph-  
phanes in Nubibus uocabulo ἡλεκτωρ utitur.

Gallinago, ὁ σκολώπαξ, uel ἀσκαλώπαξ, Bequasse,  
Videcoq: Attageni (ut Aristoteles ait) similibus pennis  
est, magnitudine Gallinulæ, rostro longo, cursu celeri.  
Nemesianus poëta eā uersibus pulcherrimè depingit,  
Cum nemus omne suo uiridi spoliatur honore:  
Fultus equi niueis syluas pete protinus altas  
Ex uiujs: præda est facilis, et amœna Scolopax,  
Corpore non Paphijs auibus maiore uidebis.  
Illa sub aggeribus primis, qui proluit humor  
Pasitur, exiguos sectans obsonia uermes.  
At non illa oculis, quibus est obtusior, etsi  
Sint nimium grandes, sed acutis naribus instat,  
Impresso in terram rostri mucrone, sequaces  
Vermiculos trahit, et uili dat præmia linguae.

Gallus, ἡλεκτεῦων, ἡλεκτωρ, tanquam ἀπολέκτωρ, id  
est, à lecto reuocans, vng Cocq.

Graculus, ὁ κορακίας, primum genus Moneclatū,  
vne Graille emmantelee.

Grus, ὁ γέγρας, vne Grue. Cicerō scribit Grues cum

loci calidiora petentes maria transmittunt, trianguli formam efficiere.

## H

Hirundo, χελιδὼν, Harōdelle, avis est nota, ueris nuntia: cui à natura summū donū tributū est, ut si acu earū oculi pūcti fuerint, atque excæcentur, usum recipiant.

## L

Liua, πλειὰς, Columbæ species, vng Bizet.

Luscinia, ἀνδών, ab αἰεὶ ἔσδω, quasi perpetuò canens ubi semel inæperit, Rossignol. Multa de huius avis natura lege apud Aristotelem lib. 4. ἔ 9. de Histor. animal. ἔ Plinium lib. 16. cap. 29.

Lutea, ἡ χλωεὺς, Videtur esse fœmina Vireonis, La femelle du Loriou. Sic autem dicta est, quòd inferiorem partem pallidam habeat.

## M

Meleagris, Geline d'Aphrique: parit oua rubro interpuncta, ut Phasiana. Descriptionem huius avis habes apud Aelianum.

Mergus, ἡ αἰθὺα, avis ex qua tempestatem prænosciimus: de qua lege Aratum ἔ Virgiliū, vng Plonget. Mergus autem ideo dicitur (ut scribit Varro) quòd cibum captans, se subinde in aquam immergat.

Merops, lege Apiaſter.

Merula, ὁ κόττυρος, Merle, huius avis caro durior, quàm perdiciis aut attagenis.

Milvus, ἡ πῆνος, Milan, avis est nota, quam Aelianus usque adeò rapacē esse scribit, ut carnes è macello auferat, tamen ex Olympiæ aris nunquam attingit.

Monedula, ὁ χοροῖος, Chouette, Furatur aurū, unde illud est Ciceronis in Oratione pro Flacco, Nō plus au-

g. 4.

rum tibi, quàm monedulae committebant. Grammatici deducunt κλῶν à uerbo κλῶ, quod clamo significat, & pleonasmò τῆς οὐ τοι fit κολοῖος. Nam clamosa avis est.

## N

Nisus, quibusdā uidetur esse nostre Espreuier. De mutatione Nisi in hāc auē lege Seruiū grāmat. in 1. Georg.

Noctua, ἡ γλαυξ, Hibou, Chathuant. à Latinis sic dicta est, quòd noctu uolet & cantet.

## O

Olor, κύκνος, Cygne. Huic aui tanta est in extrema uitæ spiritu tranquillitas, ut sibi tanquam nēniam can-  
tet, quanquam Alexander Myndius apud Athenæum dicit se morientes Cygnos affectatum fuisse, eorum ta-  
men cantum non audiuisse.

Onocrotalus, Butor, similitudinem oloris habet, & quum collum in aquam mergit, uelut asini ruditum edit, unde Onocrotalus dicitur, quasi Asini clamor.

Ortygometra, ὀρτυγμήτρα, Le roy & mere des Cailles. Avis est (ut Alexander Myndius apud Athenæum refert) Turturis magnitudine, longis cruribus, colore inter croceum & uiridem medio.

## P

Palumbus, Palumba, uel Palumbes, palūbis, φαῖα, Ramier, ex columborū genere, maior quàm Vinago. Columborū autē species apud Aristotelē lib. 8. sunt quinque, φαῖα, φαῖα, φαῖα, φαῖα, φαῖα (nam lib. 5. φαῖα omittit) id est Palumbes, columbus, uinago, turtur: ut Γαζα interpretatur, qui duas primas uoces Græcas una dictione, Latini sermonis paupertate exprimere coactus est. Aquitani uerò, ut distinctæ aues sunt, ita diuersis nominibus eas appellāt. φαῖα enim ab eis, sermo



nis Græci uestigia adhuc retinēti bus Phauier dicitur.

Passer, ὁ σπυρίδης, Vng moineau. Hunc aut propter salacitatē, breuissimā uitā esse ferunt. Est et alius Passer alaude magnitudine, de quo Actuarius medicus lib. 2. Regaliū sermonū, ἐστὶ τὸ μὲν σπυρίδης ὁ μέγας ὀπίρρῳς πς, ἔ μὴτε ἐν δένδροις, μὴτε οἰκηματίοις οἰκεῖ, καὶ ζῆναι δὲ ἐν ταμοῖς ἄκροις τῶν ἀμυνῶν φωνῇ μάλα σφόδρα κελεύειζων, πὲρ δὲ χρωματὶ καὶ μέγεθος ὁμοιον τῇ κορυδαλῷ, καὶ τὸν χυμῶνα οὐχ ἔχειται. Id est, Est autem Passer magnus terrestris aliquis, nō in arboribus, neque in domibus habitat, uerū in summis uirgultis desidet, uoce admodū garrulla, colore et magnitudine alaude similis est, et hyeme non apparet. Porro τῶν σπυρίδων nomine auiculas omnes in dumis uersantes Galenus ferē intelligit.

Pauo, uel Paimus, ὁ ταῶς. Avis nota.

Paua, fœmina Pauonis ab Ausonio dicitur, tamē Columella semper Pauonē fœminā dicit. Ταῶς autē (ut Athenæ⁹ ait) dicitur ἀπὸ τῶν πτερυγίων ταῖσας. Id est, ab expādendis pennis. Galenus scribit huius auis carnē, q̄ Phasianorū et Attagenū duriorē fibrosiorēque, et ad coquēdum difficiliorē esse. Pauone sic delectabatur Alexander, ut eius interfectori magnā multam irrogarit.

Perdix, ὁ πέριξ, perdrix. Athenæus scribit lib. 9. πέριξας et κακχαλῆας dici, unde factum est κακχαλίζειν, et uerbū κακάβο, quod author carminis Philomelæ apud Ouidiū perdiri tribuit. Huius auis caro à Galeno inter ea quæ ad coquendum facillima sunt refertur.

Phalacrocorax, id est, Coruus aquaticus, vng Cormorant. Plinius lib. 10. cap. 48.

Phasianus, ὁ φασιανός, Phaisant. Hæc auis à Phasi fluuiο ad nos traducta est. Martialis,

Argua primùm sum transportata carina.

Antè mihi notum nil nisi Phasis erat.

Huius avis caro, quòd ad concoctionem & nutrimentum attinet, Gallinarum carni similis est, uoluptatem tamen in edendo superat.

Pica, ἡ κίττα, vnc Pic. Avis nota, quæ humana profert, de qua Martialis,

Pica loquax cæta dominum te uoce saluto:

Si me non uideas, esse negabis auem.

Pica glandaria, vng Iay.

Picus Martius, σκουκολάπης, ab Aristotele. i. quercus percussor dicitur, vng Piuert, vng Pic. Nomē habet apud Latinos à Pico Saturni filio. lege Plin. lib. 10. ca. 18.

Psittacus, ἡ ψιττάκη, vng Perroquet. Avis est in India frequens, ubi tamen eam comedere religio est. Sacra enim putatur, quòd humanam uerborum appellationem explanata oris expressione imitando consequatur. AELianus & Plinius lib. 10. cap. 42. & Cato de re Rustic. lib. 3. cap. 9. & 13.

Q

Querquedula, κερχεῖς, vng Rasle. Refertur à Varro-  
ne lib. 3. de re Rustic. inter eas aues, quæ nō cōtētæ solū  
terra sunt, sed aquā requirunt, ut anseres & anates.

S

Struthiocamelus apud Plinium lib. 16. cap. 5. Au-  
truche. Galenus tamen affirmat σκουθοκάμηλον non  
esse uocem ueteribus consuetā, qui eam auem μεγάλην  
σκούρον semper uocauerunt. Struthiocamelū autem di-  
ctum opinor, quòd multa camelo similia habeat: ex cæl-  
sum caput & paruum, longum collum, tibias proceris-  
simas, & frequentibus squamulis compactas. Caro eius

excrementitia est, & ad coquendum difficilis.

Sturnus, ὁ ῥάπος, Estourneau. Avis gregatim volans, uulgo nota.

## T

Tarda, ὠπὲς, uel ἔπὲς, Houtarde, asio aliter dicitur Plinio: Latini nomen huic aui à tardo uolatu indiderunt. Nā (ut Xenophon apud Athenaeum ait) uolatu adeo breui utitur, ut si quis instet, eā capere possit. Graeci autem à plumis circa aures demissis, ita ut auriculas referant, ita uocauerunt. Athenaeus hanc aue μμυμπικὴν, id est eorū quae homo agit, imitatricem: atque hoc modo à uenatoribus capi scribit. hi enim pharmaco aliquo κολλητικῷ oculos inungunt, quo cilia sibi glutinent: quod dum imitari studet haec aui, caeca fit, facileque capitur. Caro eius inter grues & anseres media est.

Trochilus, Regulus: τρεῖς βύ, quasi auium praeses ab Aristotele dicitur, uulgo Regaliolus, vng Roytelet.

Turdus, ἡ τίχλη, Vne Griue, ab omnibus ferè dicitur. Huic aui quanquam Martialis primas inter aues tribuit, tamē eius caro, quā perdicis, attagenis & columbae (si Galeno credimus) durior est.

Turtur, ἡ στύων, Turterelle, ex genere columbarum. Nomen apud Graecos & Latinos à sono ei aui inditum est.

## V

Vespertilio, ἡ νυκτεῖς, Chauuefous, media cuiusdam speciei inter auem & murem est, ut Mus alatus dici possit. Ex uolucris solus Vespertilio (ut Plinius ait) parit. dicitur autem Vespertilio, quod uespere se ad uolandum proferat.

Vinago, ἡ οἰβάς, aui est ex genere columbarum, de qua iam dictum est, Grand colomb. Vinagine autē uel οἰβάδα g. iiij.



dictam arbitror, q̄ uindemiæ tempore appareat. Sed loci hunc *ᾠὲ οὐράδος* apud Aristotelem corruptū uir quidā doctissimus suspicatur, legendūque putat ἢ ἰνὰς ἀπὸ τῆς ἰνῶν, quod ea auis ex neruis multis, illisq̄ ualidissimis constet, ut neque parari nisi detracto tergo facile possit. Hæc auis pulcherrima est torque insignis, plumis uersicoloribus, corpore amplo, pedibus humilibus: in Hispania frequens est.

Vireo, *χλωρίων*, Lorion, Gallico nomine dicitur, Vide Lutea.

Vlula, ὁ αἰγώλιος, noctu pascitur, die rarò apparet, Cheuesche, alij Hibou. Seruius Grammaticus ἀπὸ τῆς ὀλολύζειν, id est, ab ululando dictam putat.

Vrupa, ὁ ἔπυψ, Avis cristis è capite exeuntibus galeata, Huppe. In quibusdam locis Gallie dicitur Putput à fœtore. Nam nidum suum hominis stercore, luti loco illinit, ne homines ad pullos suos accedant.

Vultur, ὁ γύψ, Vaultour. Avis est carniuora. in hominum enim cadauera infestissima fertur, ac hominem ad moriendum uicinum, quando supremum uitæ diem agat, diligenter obseruat. Expeditos etiam in bellū exercitus præfensione quadam consequitur, planè sciens, & quod ad bellum proficiantur, & quod omnis pugna strages edere soleat. Locum futuro bello septem ante dies, quàm pugna cōmittatur, præuidet, in eamque partem, in qua alterutra pars succumbet, respectat. Quamobrem reges olim speculatores solebant præmittere, qui renuntiarent ad quàmnam partem uultures oculos referrent.

INDEX VVLGARIVM NOMI-  
 num Arborum, Fruticum, & Herbarum, aliorum-  
 que vocabulorum, quæ in ordine Alphabeti libri  
 non inveniuntur.

A			
Abellina	16	ἀμαμνής	34
Acetosum triphyllon	54	ἀμανίται	36
ache	11	ameos	8
accula	67	amydon	8
acus pastoris	37	Ἀναδεδρομαλάχη	8
Agrimoine	35	anis	10
agripalma	36	Ἀφροκόροδον	67
αἰχίλοπις	5	ἀπινθιον	3
aigrum persil	11	apium sylvestre	17
ainga	23	apium risus	17
Albucus	15	Aquisfolium	30
alesnes	50	Araba	32
alifier	47	arbre portant coton	38
alisma	31	arbricotier	49
alquequengi	38	arbricots	13. 62
alleluya	54	argalicum	63
alliaria	7	argulier	15
aloe Gallica	37	armoiries	17. 77
altercum	12	armoife	13
altara	41	arroche	15
alun	8	ἀρτεμύς	13
aluyna	3	artichault	20. 21. 25
Amandier	8. 53	aruagus	55
ambra	61	Aspalathium	6
ambrosia	59	asparagus Gallicus	16
		ἀσπαράγος	15

# INDEX.

aspergula	37	Behen album	59
aspic	52	beniouin	45.69
ἀσπούητος	44	berberis	54
Athanasia	14	beria	78
auelline	16	berle	11.45.70
aulne	7	bete de pré	47
aulx	7	Biere	78
auoine	16.18	bistorta	18
auoine folle	5	Blanc	35
aureo	38	blé	76
auricula asini	70	blé barbu	36
Αζαρολun	51	blé de poulle	35
ἀφροσκόπος	7	blé frimé	51
B		blé sarrazin	34
Bacilles doubles	64	Bonnes dames	14
balsamina	70	bonifacia Italorum	41
balsamum	51	borrago	18
balustres	16	boullon blanc	38
baguenaudes	38	boux	19
baguenaudier	27	Brisaculo	73
barba Dei	37	bruyere	29.34
barba sacerdotis	37	Bugla	69
barbuta	41	bugraues	10
barbotine	3	C	
bardana maior	12.44	Cacabus Veneris	53
baselic	53	cachrys	65
baselic menu	5	calendula	45
baselic saunage	53	cameline	51
bassins	24.64	camomille	10
βαρύπικρον	3	candela regis	58
βάννα	65	candelaria	58



# INDEX.

<i>canella</i>	21.25	<i>chardonnette</i>	21
<i>canna</i>	14	<i>chardouffe</i>	23
<i>capenduta poma</i>	54	<i>charme</i>	21
<i>capillus Veneris</i>	5	<i>charpentaire</i>	67
<i>capreola</i>	29	<i>chasse bossé</i>	47
<i>capres</i>	20	<i>chauffetrape</i>	75
<i>caprifolium</i>	57	<i>chesnette</i>	23
<i>cardopatum</i>	23	<i>chiches</i>	24
<i>carduus beatae Mariae</i>	46	<i>choux cressus</i>	18
<i>carduus suarius</i>	23	<i>choux rouges</i>	18
<i>carlina</i>	23.30	<i>Cicer montanum</i>	15
<i>carrotes</i>	21.32.56	<i>cichorea lutea</i>	41
<i>carrubes</i>	69	<i>cichoree sauvage</i>	25
<i>cārtanum</i>	27	<i>ciutaria</i>	52
<i>cauda vulpina</i>	7	<i>citrage</i>	50
<i>caulis capitatus</i>	18	<i>citronnier</i>	40
<i>Centinodia</i>	60	<i>Κλίδρη</i>	7
<i>centum capita</i>	34	<i>clou de girofle</i>	21
<i>cepa canina</i>	9	<i>Cocq</i>	29
<i>cerfueil</i>	37	<i>coing franc</i>	23
<i>cerisier</i>	22	<i>coingnaciére</i>	25
<i>cerises de dela la mer</i>		<i>coloquinte</i>	27
12.23		<i>commun</i>	31
<i>ceterach</i>	15	<i>consolida maior</i>	70
<i>Chamara</i>	67	<i>consolida media</i>	17
<i>chamaeleuce</i>	76	<i>conus</i>	25
<i>champignons</i>	36	<i>coquelicots</i>	55
<i>chandelle de nostre da-</i>		<i>coquelourdes</i>	10.32
<i>me</i>	48	<i>coquille de prestre</i>	51
<i>chanure</i>	20	<i>cōriandre</i>	29
<i>chanure sauvage</i>	7	<i>cormier</i>	71

# INDEX.

corneola	47	δενδρομαλάχη	49
cornu cerui	29	dens leonis	8.41
cornuette	39	dens canis	29
corrigiola	60	dent de chien	6
corruda	15	Diagrydion	31
costus Arabum	29	dinarella	29
cotonaria	38	Δρυπιτίς	32
coudre	29.53	E	
couleuree	9.18	Ἐκατοκέφαλον	34
courge	27.30	Enula campana	39.55
Cramoisi	27	Ers	35.54
creffon alenois	21.52	eruca nobilis	34
creffon des ruisseaulx	70	Escarlatte	27.42
cretha marina	16	esglantier	66
creste marine	30	esglantier de bõ odeur	65
cruciata nostra	45	esparge	15
Cuculi brachula	13	l'espec des bleds	78
cucumis anguineus	31	espargoutte	14.56
cucumis asininus	30	espine uinette	54
cucumis sylvestris	30	espurge	45
cucurbita barbara	30	esula rotunda	56
cuminum sylvestre	32	Exacum	22
cunila capitata	54	Ἐξάρον	22
couragee	30	F	
Cyboule	37	Faba suis	12
cymbalaria	29	fabu inuersa	72
cynoglosson herbariorum	48	falsia aquatica	47
		farfarum	17
petit cypres	3.23	fayant	35
	D	Fenoil	36.50
Daucus	56	feu ardent	18

## INDEX.

<b>Figues royales</b>	31	<b>græcanica arundo</b>	14
<b>figuier</b>	36	<b>graine de paradis</b>	21
<b>fistularia arundo</b>	14	<b>gramen Parnasium</b>	33
<b>Flambe bastarde</b>	4	<b>gratteron</b>	10.44
<b>florata</b>	37	<b>gratia dei</b>	33
<b>Folium Indicum</b>	49	<b>grenade</b>	62
<b>fougere</b>	36	<b>grenadier</b>	49.62
<b>fourment</b>	76	<b>grenil</b>	47
<b>Fraiſe</b>	36	<b>griottes</b>	22
<b>fremium</b>	10	<b>groſelier</b>	61
<b>frefne</b>	36	<b>groſelier rouge</b>	54
<b>frefne champeſtre</b>	54	<b>Guede</b>	38
<b>Fume terre</b>	20.36	<b>guimauve ſauuage</b>	6
<b>fuſaria</b>	35	<b>guiſnes douces</b>	22
<b>G</b>		<b>guiſnes noires</b>	22
<b>Galanga ſylueſtris</b>	25	<b>guiſnes fort rondes</b>	22
<b>galluli</b>	25	<b>guiſnes fort rouges</b>	22
<b>garance</b>	35	<b>guy</b>	62.77
<b>garine</b>	26	<b>H</b>	
<b>garyophyllata</b>	46	<b>Hannebanne</b>	12
<b>gæſipes</b>	38	<b>haſtula regia</b>	15
<b>Gentil bois</b>	23	<b>Hebene</b>	38
<b>germandree</b>	23	<b>hedera vinealis</b>	39
<b>Giroflee</b>	77	<b>helioſtrophos</b>	49
<b>giroflee ſauuage</b>	48	<b>hepatitis</b>	35
<b>guthago</b>	50	<b>herbe au chat</b>	20.53
<b>Gladiolus</b>	26	<b>herba cataria</b>	36
<b>glaycul</b>	37	<b>herba cruciata</b>	38
<b>glaycul de riuere</b>	4	<b>herba contra peſtem</b>	28
<b>glouteron</b>	12	<b>herba fullonum</b>	44.63
<b>Goutte de lin</b>	21	<b>herba di prete</b>	74



## INDEX.

herba Gallica	40	L	
herba Hierosolymitana	9	Lactuca capraria	74
herba Hierusalem	18	lactuca leporina	71
herba sardoa	17	ladanum	44
herba solaris	40	laicteron	44.72
herba sancti Innocentis		lanaria	58
60		lancœolata	59
Hieble	22.32	lauande	52
hippomanes	12	lauron	5
Hornala	41	leuesche	46.71
houbelon	9.48	Liege	5
Hurgon	17	lierre	38
I		lignum aloës	6
Iarum	13	lignum foetidum	9
iasia alba	53	liliastrum	28
iasmin	41	lilium marinum	47
Iesse	24	lingua æruina	57
If	70.72	liseron	70
Ionc a faire cabas	19	liset	70
ionbarbe	6	lisseron	26
Irio	34	Lucerna	48
iris syluestris	33	lunaria	56
Ina muscata	23	luparia	4
ingrolina	68	M	
iniubæ	60	Maiorana	8
iuncus quadratus	25	μαρούλιον	43
iuncus triangularis	25	mala insana	50
K		malum terræ	13
Keiri	46	mandegloire	49
kermes	27	manus Christi	64
kernua	64	marguerites	70

# INDEX.

<i>marguerites blanches</i>	24	<i>mourron</i>	7
<i>grande marguerite</i>	17	<i>mourron violet</i>	12.18
<i>mariolaune d'Angleterre</i>		<i>mourron quarré</i>	9
54		<i>mousse des arbres</i>	19
<i>mariolaine bastarde</i>	54	<i>grand Muguet</i>	10.33
<i>mariscus</i>	43	<i>murices</i>	75
<i>marrouche</i>	50	<i>muscade</i>	52
<i>marrubiastrum</i>	16	<i>myrta</i>	52
<i>massa</i>	73		
<i>maſtic</i>	50.74	N	
<i>matrifylua</i>	57	<i>Nasturtium Orientale</i>	32
<i>Melampylon</i>	16	<i>nauet</i>	52
<i>melancranis</i>	43	<i>Nemuphar</i>	53
<i>melones</i>	57	<i>nerium</i>	65
<i>memintha</i>	54	<i>Nielle</i>	37.49
<i>mentha Sarracenia</i>	29	<i>Noifette</i>	16
<i>mercurialis</i>	56	<i>Noix commune</i>	42
<i>meure</i>	69	<i>Nux moſchata</i>	21
<i>meurier</i>	52.69	O	
<i>meurte</i>	51	<i>Oculus cati</i>	11.18
<i>mēxereon</i>	23.73	<i>oculi populi</i>	6
<i>Milium ſolis</i>	47	<i>Oeuillets</i>	77
<i>mullefolium</i>	51	<i>oeuillet d'Inde</i>	57
<i>millemorbia</i>	36	<i>Oignon</i>	11.77
<i>millepertuis</i>	10.41	<i>oignon de bois</i>	40
<i>Molle gramen</i>	41	<i>oignon marin</i>	67
<i>μολόχ</i>	49	<i>Oleum de Kerna</i>	65
<i>morella</i>	71	<i>oliuella</i>	73
<i>morofycon</i>	69	<i>oliuier</i>	53
<i>mors a diable</i>	37	<i>Orangier</i>	49
<i>mort a chien</i>	27	<i>orbicularia poma</i>	34
		<i>orchanetta</i>	10

# INDEX.

orme	77	Pecten Veneris	67
orpinum	72	pedicularis	71
ortie	77	persepierre	33
Osmunda regalis	32.57	persicaria acris	40
ostrutium	11	persil	11
Oxalis	45	persil bastard	21
oxyschænos	43	persil d'asne	52
oxytriphyllon	75	pertigona	62
P		peruanche	26.77
Palma Christi	30.64	pes columbinus	52
palmula	55	pes coruinus	37
pâladapium	11	peschier	49
panets saunages	32	petit mourron	9
panic	55	petroselinum Macædoni-	
panis porcinus	25	cum	11
papauerculum	45	peuplier noir	5
pardalianches	4	Piatamana	18
parella	41	pimpinella hirsuta	21
parelle	19	pin saunage	58
parietaria	39	pinasse	57
pas d'asne	17	pinastellus	57
passenelours	8	piper Indicum	58
passé fleurs	10	piper aquaticum	40
passé rage	45	pisse en liêt	8
pastel	38	Plane	59
pastellus	42	plantain	13
pastenade	56	ung plat	59
pata leonis	28	Poirier	58
pate de loup	21	poitrons	62
pauerina	7	poyure	58
pauot	50.55	poyurette	19



# INDEX

polypodiū quercinum	36	ragulisse	63
polytrichon	75	rapistrum	12
poma syrica	60	rapistrum campestre	33
pomelea	28	œdiparos	63
pommelce	45	raue	63
pommier enté	49	Rebulus	10
pommier franc	49	Ribes	54
pommier sauvage	49	ricinus	30
pommier de deux portées		Roquette	35
49		rosa frumenti	12
pommes d'amours	50	rose nostre dame	56
pommes de capendu	34	roseau	14
pommes poires	58	Rubia minor	10
ponceau	55	rubis	10
poree	17	ruta vinacea	8
poree rouge	17	S	
porrum uincale	9	Sacotin	22
portulaca	5	saffran	30
portulaca aquatica	22	saffran bastard	15.27
potularia	53	saligots	75
pourpié	5.61	salinaris herba	58
Prunelier	61	salmonde	37
prunes de damas	62	salvia montana	71
Psilothrum	9	salvia sylvestris	59
psora	66	sanue	44
Pulegium montanum	17	saponalis	27
pulicaria	28	saponaria	63
pulicaris herba	62	sarriette	31.66
Pymant	18	saxifraga	68
R		Scipouille	67
Radix pontica	63	oxopodov	7

# INDEX.

<i>scrofularia</i>	36	<i>Tormentilla</i>	41.56.63
<i>scrota sacerdotum</i>	35	<i>tortella</i>	34
<i>sebestæ</i>	62	<i>route bonne</i>	41
<i>senegré</i>	18.12	<i>rouzella</i>	69
<i>serapinum</i>	66	<i>Tremble</i>	5
<i>sermontain</i>	68	<i>tremula</i>	61
<i>serpentaria</i>	32	<i>treusse blanc</i>	75
<i>serpouillet</i>	68	<i>treusse iaulne</i>	75
<i>Sigillum salomonis</i>	59	<i>trifolium</i>	75
<i>sinapi rusticorum</i>	73	<i>trio</i>	34
<i>Solatrium dormitorium</i>		<i>trionum</i>	34
70		<i>trique ma dame</i>	6
<i>solea piscis</i>	19	<i>troesne</i>	47
<i>souchet</i>	15	<i>trusse</i>	76
<i>soulcie</i>	10	<i>Turbith</i>	7.59.75.76
<i>spelta</i>	78	<i>turpetum</i>	59
<i>spinachia</i>	16	V	
<i>Sternutamentaria</i>	62	<i>Valeriane</i>	76
<i>stœchas citri</i>	33.71	<i>ualeriana maior</i>	57
<i>stœchas citrina</i>	8	<i>Verart</i>	33
<i>summeia</i>	8	<i>uerbena communis</i>	76
<i>Surpepon</i>	57	<i>uermeillon</i>	17
<i>suseau</i>	4	<i>uermicularis</i>	6.75
T		<i>uermiculum</i>	35
<i>Tamariscus</i>	72	<i>uernigo</i>	43
<i>tanaœtum</i>	14	<i>ueronica</i>	73
<i>taraxacon</i>	41	<i>ueruena</i>	76
<i>Testiculus canis</i>	31	<i>uesse saunage</i>	11
<i>Tigne</i>	54	<i>uesseron</i>	12.76
<i>tinaria</i>	60	<i>Vinciboscum</i>	57
<i>liqua</i>	30	<i>uioyrne</i>	9

# INDEX.

uirga pastoris	43	Y	
uirile canis	13	Yuraye	6
uirile sacerdotis	13	Z	
X		Zambacus	41
χαλιφμων	51	Ziſſipha	60

## INDEX NOMINVM GALLI- corum & vulgarium piscium, ac earum dictio- num, quæ in ordine alphabeti non reperiuntur.

A		C	
Able	79	Caballinus marinus	83
Aigrefin	79	calamarium	84
aiguille	79	cancer	81
Aloſe	79	cancro	81
Anchois	80.90	cappæ longæ	81
anguille	79	carabaſi	87
antonix Druſi murena		caragolus	86
quantum in delicijs	86	carides	81
Aſtaci	81	Celerinus	86
Aulbournæ	80	cæphalo	81
B		cete	81
Balene	80	Chieppa	79
barbatulus	85	Citharus quomodo ſimi-	
barbua	87	lis rhombo	81
baſtonaca	88	Cobio	83
βατος	89	cœchus	80
Beuf de mer	88	cœchus	80
Brochet	84	cau	80

h.ij.



# INDEX.

congre	80	H	
coulac	79	Heliogabalus	86
κοχλίας	82	Hirpinus	82
Crabes	81	I	
creac	90	Imbrices	82
crocus refugitur à croco-		imperator piscis	83
dilo	81	L	
D		Lacertus	90
Δάκτυλοι	82	lamproye	84
Daurade	79	lampugs	80
Delphin φαλαῖδρωπος	82	lactes murenarum	86
Digiti	82	Lendola	83
E		Limandes	87
Ericius	83	limasson	82
Escarrot	82	limasson de mer	82.86
escreuiffe de mer	83	lingulaca	90
esturgeon	90	Loches	83
F		lorigo & sepia in quo dif	
Flex	87	feranc	84
flutæ	86	loup	84
G		loutre	83
Gammari	81	M	
gathes	79	Maquereau	82
Glorieuse	88	Merlus	79
Gobio	83	Morue	83
gobiones qui ὀλιγότροι		moules	85
dicantur	83	Mulet	84
gobius	83	murena altilis	86
Gramphus	91	mus marinus	91
grapault de mer	88	mus terrestris	91
Gutta grampha	91	musculi	85

# INDEX.

mustela	84	faulmon	89
N		scarus	79
Nacre	86	σκαρίς	92
Nerite	86	Servi proiecti in uinaria	
O		murenarum	86
Ὠμόδες	91	Silurus	90
omar	83	Soles	87
Orata	80	σφώπατος λάβραξ	84
Ὀσραχόδεσμον	91	σρόμβος	82
ostrea altiliā	86	T	
P		Tanche	91
Paguri	81	taprobana	91
Pectines quomodo dicantur uolare	88	tante	84
perche	88	Testate	81
φρέονος κοχλίας	82	Thunnine	91
Pleza	87	Triga	85
plies	87	trigla	85
Poles	87	τεχίδες	90
poupre	88	Turbo	82
Q		turbots	87
Quarlets	87	Truye	81
R		V	
Raye	89	Vedius Pollio	86
Rhombus	89	Vina	83
Rouge	85	uinaria cochlearum	82
S		Vmbrina	92
Sardes	90	Vrtica	92
sardines	90	Z	
		Zaphirus	79
		b.ij.	

INDEX NOMINVM GALLI-  
corum & vulgarium avium, ac eorum vocabulo-  
rum, quæ ordine alphabeti digesta non sunt.

A		D	
Aigle	94	Diabolus	98
Alouette	93.95.98	E	
Antruche	102	Espremier	100
B		estourneau	103
Battemare	96	F	
Becquefigue	97	Foulque	97
bequasse	98	Francolinus	95
beree	97	G	
Butor	100	Galericulus	93
buçart	95	Geline	98
C		geline d'Aphrique	99
le roy & mere des Cail- les	100	Graille	98
cane, ou canard	93	grue	98
Chardonneretus	93.95	H	
chathuant	100	Harondelle	99
chaunefouris	103	Heron	94
cheuesche	104	Hibou	95.100
chouette	99	Houtarde	103
Cochewis	93	Huppe	104
cocon, ou coucou	97	I	
cormorant	101	Ieur anseris fertilis	94
corneille	96	L	
corbeau	97	Ligurinus	93
cocq	98	Lorion	104
Cygne	100	la femelle du Lorion	99



# INDEX.

M		Putput	104
Martinetus	94.97	Q	
Merle	99	Querærella	96
grand merle	95	R	
mesange	94	Ramier	100
Milan	99	rasle	102
Moineau	101	Regaliolus	103
motacilla	96	Roytelet	103
Mus alatus	103	rossignol	99
O		S	
Oye	94	Sacer ales	93
P		Scolopax	98
Perdris	101	T	
perroquet	102	Tarinus	93
Phaisant	101	Turterelle	103
phawier	101	V	
Pic	102	Vaultour	104
pie	102	Verdon	97
Plongget	99	Vinago	100.103
Fouille	98		

## ERRATA SIC CORRIGITO.

Fo. 13. lin. 30. Artemisia, πλατύφυλλος,

Fo. 50. lin. 18. Marrubium, ωγρίανος:

Fo. 64. lin. 8. ἰδύοσμος,



EXCVDEBAT ROB. STEPHA  
NVS TYPOGRAPHVS RE-  
GIVS, LVTETIAE, ANN. M. D.  
XLVII. XIII. CAL. AVGV. S.